

Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає інформаційне повідомлення щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області станом на 06 квітня 2023 року.

В посівах озимої пшениці гусеницями озимої совки заселено 16 % від обстеженої площі 851 га, в середній чисельності 0,3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено – 1 % рослин в сильному ступені, гусениці IV-V віку.

Злаковими блішками за середньої чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 13 % від обстеженої площі озимої пшениці 851 га.

Борошнистою россою в середньому уражено – 2, максимально – 5 % рослин озимої пшениці з середнім розвитком хвороби 1 % на 379 га з 851 га обстежених. Бурою іржею в середньому уражено 3 % рослин озимої пшениці з середнім розвитком хвороби – 1, максимально – 2 % на 77 га з 851 га обстежених. Септоріозом в середньому уражено 2 % рослин озимої пшениці з середнім розвитком хвороби – 1, максимально – 2 % на 574 га з 851 га обстежених.

В Кропивницькому районі (Устинівський район) борошнистою россою уражено 1 % рослин озимого ячменю з розвитком хвороби 1 % на 10 га з 34 га обстежених.

На посівах, де дотримуються технології вирощування культур і своєчасно провели боронування, підживлення та оздоровлення рослин, не відмічається перезараження та поширення хвороб. Під час виходу рослин в трубку, за інтенсивності ураження борошнистою россою, бурою листовою іржею, гельмінтоспоріозом, іншими плямистостями 1 %, септоріозом листя 3-5 %, кореневими гнилями за достатнього зволоження – обприскують рекомендованими фунгіцидами відповідного спектру дії.

В Олександрійському районі (Петрівський район) ріпаковим листоїдом в середній чисельності 1 екз. на кв.м пошкоджено 2 % рослин озимого ріпаку в слабкому ступені на 63 га обстежених площ.

Хрестоцвітими блішками в середній чисельності 1,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 5 % рослин озимого ріпаку в слабкому ступені на 320 га з 438 га обстежених.

Альтернاریозом уражено 5 % рослин озимого ріпаку з розвитком хвороби 4 % на 118 га з 438 га обстежених. Пероноспорозом уражено 2 % рослин озимого ріпаку з розвитком хвороби 1 % на 320 га з 438 га обстежених.

Стан посівів ріпаку покращують агротехнічними заходами (розпушування міжрядь, боронування, підживлення азотними добривами). За появи хвороб проводять оздоровлення фунгіцидами згідно Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (далі – Державний реєстр). Осередки заселення хрестоцвітими блішками (ЕПШ 3-5 екз. на кв.м), листовідами (ЕПШ 3 екз. на кв.м), прихованохоботниками (ЕПШ 5-6 жуків на рослину) захищають через обробки рекомендованими інсектицидами.

В посівах озимої пшениці мишоподібними гризунами заселено 46 % від обстеженої площі 851 га, середня чисельність колоній – 1,8, максимально – 3 на га, в середньому – 3, максимально – 7 нір на колонію. В посівах озимого ячменю шкідником заселено 52 % від обстеженої площі 203 га, середня

чисельність колоній 1 на га, в середньому 3 нори на колонію. В посівах озимого ріпаку шкідником заселено 13 % від обстеженої площі 438 га, середня чисельність колоній 2 на га, в середньому 8 нір на колонію. На площах багаторічних трав середня чисельність колоній – 2 на га, в середньому 4 нори на колонію на 100 % від обстежених площ 70 га.

За економічного порогу шкодочинності (3-5 кол/га) мишоподібних гризунів необхідно продовжувати винищувальні та профілактичні заходи родентицидами згідно Державного реєстру.