

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає оперативну інформацію щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області за період 07-13 квітня 2023 року.

Озима пшениця, озимий ячмінь – кущення. Озимий ріпак – утворення листової розетки - ріст стебла.

Протягом звітної періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

В посівах озимої пшениці гусеницями озимої совки за середньої чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 34 % обстежених площ, личинками хлібної жужелиці (туруна) в середній чисельності 0,2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 12 % обстеженої площі, злаковими блішками за середньої чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 32 % обстежених площ. В теплі сонячні дні у посівах озимої пшениці спостерігається літ злакових мух: шведські мухи в середньому 2 екз. на 100 п.с., гессенська муха – 1 екз. та пшенична муха – 7 екз. на 100 п.с на 17-32 % від обстежених площ, злаковими цикадами в середній чисельності 12 екз. на 100 п.с. заселено 7 % обстежених площ. Борошнистою россою уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 25 % обстежених площ, бурю іржею уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 3 % обстежених площ, септоріозом уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 75 % обстежених площ (2173 га).

В посівах озимого ячменю гельмінтоспоріозом уражено 3 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 100 % обстежених площ, бурю іржею уражено 5 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 63 % обстежених площ (135 га).

В посівах озимого ріпаку гусеницями озимої совки за середньої чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 12 % обстежених площ, хрестоцвітими блішками за середньої чисельності 3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 14 % обстежених площ, капустяним стебловим прихованохоботником за середньої чисельності 1,6 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 28 % обстежених площ, ріпаківим листоїдом за середньої чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 24 % обстежених площ. Альтернاریозом уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 31 % обстежених площ, пероноспорозом уражено 1 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 24 % обстежених площ, фомозом уражено 3 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 15 % обстежених площ (944 га).

На площах озимої пшениці середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 1,7, нір на колонію – 4 на 27 % обстеженої площі 2173 га. На площах озимого ячменю середня чисельність колоній шкідника – 1, нір на колонію –

3 на 63 % обстеженої площі 135 га. На площах озимого ріпаку середня чисельність колоній шкідника – 1, нір на колонію – 3 на 36 % обстеженої площі 944 га. На неорних площах середня чисельність колоній шкідника – 1, нір на колонію 4 на 100 % обстеженої площі 4 га.