

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає інформаційне повідомлення щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області станом з 04 по 09 липня 2026 року.

Озима пшениця – воскова стиглість. Соняшник – бутонізація, початок цвітіння. Кукурудза – викидання волоті. Соя – бутонізація. Картопля – цвітіння, кінець цвітіння. Сад – ріст плодів.

Протягом звітної періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

В посівах озимої пшениці хлібними жуками в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 35 % обстежених площ (452 га).

В посівах кукурудзи злаковими блішками за середньої чисельності 5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 6 % рослин на 73 % обстежених площ, злаковими попелицями за середньої чисельності 8 екз. на рослину в середньому пошкоджено 7 % рослин на 53 % обстежених площ, гусеницями озимої совки в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 16 % обстежених площ, яйцекладкою стеблового (кукурудзяного) метелика в середній чисельності 1 яйцекладка на заселену рослину в середньому заселено 2 % рослин на 36 % обстежених площ (1121 га).

В посівах сої на 100 п.с. в середньому уловлювалось 6 екз. люцернового клопа на 63 % обстежених площ та 0,5 екз бульбочкових довгоносиків на 63 % обстежених площ, гусеницями чортополохівки в середній чисельності 0,3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 7 % рослин на 5 % обстежених площ, попелицями за середньої чисельності 3 екз. на рослину в середньому пошкоджено 2 % рослин на 37 % обстежених площ. Аскохітозом уражено 3 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 100 % обстеженої площі (89 га).

В посівах соняшнику буряковою попелицею за середньої чисельності 6 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 4 % рослин на 36 % обстежених площ, геліхризною попелицею за середньої чисельності 8 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 3 % рослин на 20 % обстежених площ, гусеницями озимої совки в середній чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 21 % обстежених площ, клопами в середній чисельності 8 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 7 % обстежених площ, гусеницями совки-гамма в середній чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 14 % обстежених площ. Пероноспорозом уражено 3 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 27 % обстеженої площі, септоріозом уражено 5 % рослин з розвитком хвороби 4 % на 10 % обстеженої площі, фомозом уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 29 % обстеженої площі (1570 га).

Личинками колорадського жука в середній чисельності 2 екз. на куш картоплі заселено і пошкоджено 2 % кушів. Фітофторозом уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 2 % (присадибні ділянки).

Личинками колорадського жука в середній чисельності 3 екз. на рослину томатів заселено і пошкоджено 2 % рослин. Фітофторозом уражено 1 % рослин з розвитком хвороби 1 % (присадибні ділянки).

На присадибних ділянках у середній капусті капустяною попелицею в середній чисельності 10 екз. на заселену рослину заселено і пошкоджено 20 % рослин, хрестоцвітими блішками в середній чисельності 4 екз. на заселену рослину заселено і пошкоджено 35 % рослин, капустяною білокрилкою в середній чисельності 13 екз. на заселену рослину заселено і пошкоджено 80 % рослин, гусеницями капустяної совки в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин (присадибні ділянки).

В плодovих садах (яблуня) яблуневою плодожеркою в середньому пошкоджено 2 % плодів падалиці в середньому під 30 % дерев на 100 % обстежених площ. Паршею уражено 3 % листків з розвитком хвороби 1 % на 20 % дерев, 2 % листків з розвитком хвороби 1 % на 20 % дерев на 100 % обстежених площ. Плодовою гниллю в середньому уражено 2 % плодів падалиці під 30 % дерев на 100 % обстеженої площі (4 га).

У насадженнях винограду виноградним кліщем заселено 5 % листків на 25 % кущів, із середньою щільністю 5 екз на листок (присадибні ділянки).