

Етапи	Послідовність дій	Обґрунтування
Підготовчий етап	1. Здійснити гігієнічну обробку рук, надіти маску, рукавички	Дотримується інфекційна безпека. Виключається контакт шкіри рук медичного працівника з лікарськими засобами
	2. Уважно прочитати листок призначень пацієнта та напис на флаконі (назва, доза, термін придатності).	Виключення помилкового введення іншого лікар. засобу
Основний етап	1. Відкрити нестерильним пінцетом алюмінієву кришку в центрі	Забезпечується доступ до гумового корка. Виключається пошкодження голки
	2. Обробити ватною, що змочена спиртом, гумовий корок	Зменшується обсіменіння на корку
	3. Набрати в шприц необхідну кількість розчинника, (1 мл на 100000 ОД антибіотика). Якщо ампули з розчинником додаються до флакона з порошком, потрібно використовувати одну з них	Кількість рідини, необхідна для розчинення порошку, зазначена в анотації до препарату
	4. Гумовий корок флакона з порошком проколоти голкою, з'єднаною зі шприцом, в якому набраний потрібний розчинник	Умови для введення розчинника у флакон. Використовувати розчинник, необхідний для певного препарату
	5. Ввести у флакон розчинник у необхідній кількості	Забезпечується лікувальна концентрація
	6. Зняти флакон разом з голкою з підголкового конуса і, струснувши флакон, домогтися повного розчинення порошку	Забезпечується повне розчинення порошку
	7. Надіти голку з флаконом на підголковий конус	Умови для забору вмісту із флакона
	8. Підняти флакон догори дном і набрати вміст флакона або його частину в шприц	У такому положенні вміст флакона переміщується до голки
	9. Зняти флакон разом з голкою з підголкового конуса	Від'єднання порожнього флакона
	10. Надіти і закріпити на підголковому конусі голку для ін'єкції	Для внутрішньом'язових ін'єкцій голку підбирають залежно від



		товщини підшкірної клітковини пацієнта і місця ін'єкції
	11. Випустити через голку 1-2 краплі розчину в лоток	Перевірка прохідності голки для ін'єкцій. Виключається забруднення навколишнього середовища. Зменшується ризик алергійної реакції
Завершальний етап	1.Покласти в стерильний лоток шприц, ватні кульки, змочені спиртом, накрити лоток стерильною серветкою. У разі використання одноразового шприца замість лотка беруть упаковку від шприца: на голку надівають ковпачок, дотримуючись загальних правил обережності. Шприц із закритою голкою і ватні кульки, змочені спиртом, кладуть усередину упаковки	Підготовка до ін'єкції. Дотримується інфекційна безпека