

1、石应轩医案四逆汤案

四逆汤治贲门癌术后亡阳案

石某，男，59岁，2006年11月10日初诊。因患贲门癌，在省医科大学第一附属医院术后，发生良性狭窄，经扩张后，可能发生内出血，血压80/60mmHg而再次住院治疗。在住院治疗期间，先后使用多巴胺、去甲肾上腺素、706代血浆（剂量不详），花费近2000元。最后医院让其输血，因经济困难无力支付其费用而出院。刚出院到家，请余诊治。

刻诊：面色光白，手足冰冷，自汗出，口中和，少气、懒言，舌质淡，舌苔白，边有齿痕，脉沉微细。

综合分析：身在基层，看到如此危急重症，有阴阳离决之险，遂不为西医病名（贲门癌）所困，决定留人治病，辨为**太阴病**，急予回阳救逆，方用四逆汤。

处方：

制附子（先煎）6g，干姜6g，甘草6g，急煎，少量频服。

结果：次日早上，我起早到病人家复诊，其服药后，面色红润，手足转暖，汗已止，危象顿除，测血压90/60mmHg。因患者前年到甘肃打工，带回有岷当归、黄芪，遂嘱其家人用3把黄芪，1把当归，煎服，当茶饮。服1个月余，身体逐渐康复。现在仍健在，并放羊饮奶如常人样生活。

按语：有是证，用是方，用是药，可参考现代医学的检查，为我所用，不能困于西医的病名，这样才能真正掌握中医辨证论治的精髓和真谛。前人云《伤寒论》为活人书，信矣。

（陶有强 石应轩. 冯世纶经方临床带教实录第一辑. 北京：人民军医出版社，61.）

（选者注：原书写为太阴病，患者手足冰冷，自汗出，口中和，脉沉微细，且自按语云“有阴阳离决之险”，实已由太阴病而发展至少阴病，故用四逆汤回阳救逆。）

2、干姜附子汤案

恶热 李东垣治一人，目赤，烦渴引饮，脉七八至，按之则散，此无根之脉。用姜附加人参服之，愈。

（明·江瓘 原著 苏礼等整理. 名医类案. 北京：人民卫生出版社. 220页）

许叔微 伤寒九十论 脐中出血证第九

一妇人得伤寒数日。咽干。烦渴。脉弦细。医者汗之。其始衄血。继而脐中出血。医者惊骇而遁。予曰少阴强汗之所致也。盖少阴不当发汗。仲景云少阴强发汗。必动其血。未知从何道而出。或从口鼻。或从耳目。是为下厥上竭。此为难治。仲景云无治法。无药方。予投以姜附汤。数服。血止。后得微汗愈。

论曰。本少阴证而误汗之。故血妄行。自脐中出。若服以止血药。可见其标而不见其本。予以治少阴之本。本用姜附汤。故血止而病除。

（中国医学大成. 04. 伤寒九十论.）

一婦人得傷寒數日。咽乾煩渴。脈弦細。醫者汗之。其始衄血。繼而臍中出血。醫者驚駭而遁。予曰。少陰強汗之所致也。蓋少陰不當發汗。仲景云。少陰強發汗。必動其血。未知從何道而出。或從口鼻。或從耳目。是爲下厥上竭。此爲難治。仲景云。無治法。無藥方。予投以薑附湯。數服血止。後得微汗愈。論曰。本少陰證而誤汗之。故血妄行。自臍中出。若服以止血藥。可見其標而不見其本。予以治少陰之本。本用薑附湯。故血止而病除。

3、周连三茯苓四逆汤治烦躁案

烦躁

周连三医案：段某某，素体衰弱，形体消瘦，患病年余，久治不愈。证见两目欲脱，烦躁欲死，以头冲墙，高声呼烦。家属诉：起初微烦头痛，屡经诊治，因其烦躁，均用寒凉清热之剂，多剂无效，病反增剧。面色青黑，精神极急，气喘不足以息，急汗如油而凉，四肢厥逆，脉沉细欲绝。拟方如下：

茯苓 30 克，高丽参 30 克，炮附子 30 克，炮干姜 30 克，甘草 30 克，急煎服之。

服后烦躁自止，后减其量，继服 10 余剂而愈。

(中医杂志.1965; (1): 28)

按语：少阴心肾阳亡阴伤，虚阳浮越而烦躁。又神急气喘，冷汗如油，四肢厥冷，脉微欲绝，脱象备矣。恐阳亡而阴不能继，急用茯苓四逆汤以回阳救阴，交通心肾。待阳回津复，坎离既济，则烦躁自除。切勿清热除烦，以寒治寒，否则，残阳游冰，祸不旋踵。

(陈明 张印生等.伤寒名医验案选.北京:学苑出版社(1998).145-146)

一、烦躁

周连三医案：段某某，素体衰弱，形体消瘦，患病年余，久治不愈。证见两目欲脱，烦躁欲死，以头冲墙，高声呼烦。家属诉：起初微烦头痛，屡经诊治，因其烦躁，均用寒凉清热之剂，多剂无效，病反增剧。而色青黑，精神极惫，气喘不足以息，急汗如油而凉，四肢厥逆，脉沉细欲绝。拟方如下：

茯苓 30 克，高丽参 30 克，炮附子 30 克，炮干姜 30 克，甘草 30

• 145 •

克，急煎服之。

服后烦躁自止，后减其量，继服 10 余剂而愈。

（中医杂志 1965；〈1〉：28）

按语：少阴心肾阳亡阴伤，虚阳浮越而烦躁。又神惫气喘，冷汗如油，四肢厥冷，脉微欲绝，脱象备矣。恐阳亡而阴不能继，急用茯苓四逆汤以回阳救阴，交通心肾。待阳回津复，坎离既济，则烦躁自除。切勿清热除烦，以寒治寒，否则，残阳游冰，祸不旋踵。

4、大汗亡阳——于国忱医案 桂枝加附子汤案

于国忱医案 王某，男，29岁，1952年10月12日入院。患者因慢性骨髓炎住院二月余，一日下午感怕冷、头痛，医者给予非那西汀0.2克，匹拉米洞0.2克，一次服下，约半小时许，大汗不止，恶风，尿急而无尿液，急邀中医会诊。检查：形体消瘦，面色萎黄，表情惶恐，全身大汗淋漓，四肢拘急，坐卧不宁，状甚危笃，脉沉微而数。诊为大汗亡阳，处方：桂枝10克，甘草6克，白芍10克，附子10克，生姜1片，大枣3枚。当即配药煎服，服1剂汗止而愈。（山东中医学院学报.1979；（3）：59）

按语：虚人感冒，强发其汗，不仅伤阳，而且损阴。大汗淋漓、四肢拘急、脉沉而微，有阳亡之虞，急以桂枝加附子汤温阳固表，所幸一剂汗止。若不止，当以四逆汤收功。

（陈明 张印生等.伤寒名医验案选.北京：学苑出版社（1998）.24-25

三、大汗亡阳

于鹄枕医案：王某某，男，29岁，1952年10月12日入院。患者因慢性骨髓炎住院二月余，一日下午感怕冷、头痛，医者给予非那西汀0.2克、匹拉米洞0.2克，一次服下，约半小时许，大汗不止，恶风，尿急而无尿液，急邀中医会诊。检查：形体消瘦，面色萎黄，表情惶恐，全身大汗淋漓，四肢拘急，坐卧不宁，状甚危笃，脉沉微而数。诊为大汗亡阳，处方：

• 24 •

桂枝10克，甘草6克，白芍10克，附子10克，生姜1片，大枣3枚。

当即配药煎服，服1剂汗止而愈。

（山东中医学院学报1979；〈3〉：59）

按语：虚人感冒，强发其汗，不仅伤阳，而且损阴。大汗淋漓、四肢拘急、脉沉而微，有阳亡之虞，急以桂枝加附子汤温阳固表，所幸一剂汗止。若不止，当以四逆汤收功。

5、茯苓四逆汤加味案（附桂姜同用）

王某，女，65岁。住城固县建江公社。

初诊（1965年元月15日）：患者年迈体弱，平时尚能操作家务，患有咳痰宿疾但不甚重，于气候突变时易发作，忽于三日前自感咳嗽，咯出少量白痰，心悸心慌气短，面肢微肿，即在当地卫生所诊治未效，前症更加重，动则气喘，不能平卧，脘胀纳减，面肢肿甚于前，小便量少，乃送至城内某医院门诊，诊断为急性心力衰竭。给予西药治疗，暂有减轻，带药回家续用，又复无效，病势有所进展，家中亲属皆至，为之准备后事。适我假期返回乡里，乃急邀往诊。我至其家，见患者倚坐床上，面色青黄浮肿，气喘抬肩，时而以手抓胸，自云心中异常难受，烦躁欲死。诊其脉疾数，细浮无根，舌淡有裂纹，苔白薄尚润。口唇指甲略青紫，额上出冷汗，并且下肢浮肿明显，脘腹亦胀，不思饮食，小便不利，大便未解，足胫发凉。此乃少阴寒化危证，真阳有亡脱之势。二便不利是因受纳水谷甚少，且因肾阳虚衰不能施化之故，并非实证。脉虽疾数，但细浮无根，且与额上冷汗及下肢厥逆等证并见，是虚阳外浮欲脱之象，并非热证。急宜温里回阳，用茯苓四逆汤加味。处方：高丽参6克 茯苓12克 制附片9克 干姜6克 桂枝6克 炙甘草6克 白术9克 玉竹9克。

急煎，频服。

二诊（元月17日）：服上药后，各症均减轻，已可以平卧，心悸、心慌、气喘明显减轻，小便量较前增多，浮肿略减，能进少许稀粥，足胫转温。脉细数无力，舌淡仍有裂纹，苔薄白。阳气已有回复之望，继用前方去桂枝，加当归9克、沙参12克。再进四剂，各症渐消除。惟身困无力，头昏气短，嘱重饮食调理，月余后体复如初。

（杜雨茂《伤寒论释疑与经方实验》。北京：中医古籍出版社。（2004）；167）

（五）少阴病

1. 少阴真阳欲脱（急性心力衰竭）（茯苓四逆汤）

王××，女，65岁。住城固县建江公社。

初诊（1965年元月15日）：患者年迈体弱，平时尚能操作家务，患有咳痰宿疾但不甚重，于气候突变时易发作，忽于三日前自感咳嗽，咯出少量白痰，心悸心慌气短，面肢微肿，即在当地卫生所诊治未效，前症更加重，动则气喘，不能平卧，脘胀纳减，面肢肿甚于前，小便量少，乃送至城内某医院门诊，诊断为急性心力衰竭。给予西药治疗，暂有减轻，带药回家续用，又复无效，病势有所进展，家中亲属皆至，为之准备后事。适我假期返回乡里，乃急邀往诊。我至其家，见患者倚坐床上，面色青黄浮肿，气喘抬肩，时而以手抓胸，自云心中异常难受，烦躁欲死。诊其脉疾数，细浮无根，舌淡有裂纹，苔白薄尚润。口唇指甲略青紫，额上出冷汗，并且下肢浮肿明显，脘腹亦胀，不思饮食，小便不利，大便未解，足胫发凉。此乃少阴寒化危证，真阳有亡脱之势。二便不利是因受纳水谷甚少，且因肾阳虚衰不能施化之故，并非实证。脉虽疾数，但细浮无根，且与额上冷汗及下肢厥逆等证并见，是虚阳外浮欲脱之象，并非热证。急宜温里回阳，用茯苓四逆汤加味。处方：

高丽参6克 茯苓12克 制附片9克 干姜6克 桂枝6克 炙甘草6克 白术9克 玉竹9克

急煎，频服。

二诊（元月17日）：服上药后，各症均减轻，已可以平卧，心悸、心慌、气喘明显减轻，小便量较前增多，浮肿略减，能进少许稀粥，足胫转温。脉细数无力，舌淡仍有裂纹，苔薄白。阳气已有回复之望，继用前方去桂枝，加当归9克、沙参12克。再进四剂，各症渐消除。惟身困无力，头昏气短，嘱重饮食调理，月余后体复如初。

2. 阳虚发热（附子汤）

胡××，女，28岁。咸阳市窑店公社，大寨大队社员。

初诊（1972年5月20日）：两年前，曾于产后患发热3月余未退，后经服中药治愈，一直未发。近因夏收及家务过劳而前病又作，在当地治疗十几天，效不显。现自感全身发

• 167 •

6、附子、干姜、肉桂同用（李可老医案中常用）

2.9 失眠5

程某，男，54岁。2009年10月8日。

劳倦内伤，心肾交虚，治中。

生半夏、茯苓各50g，白术、晒参、五灵脂、干姜各90g，秫米50g，炙甘草120g，制附片45g，油桂（米丸吞）3g。5剂。

【编按】劳倦伤中，以附子理中汤补火生土；因脾虚泻泄，加参灵散、四君子健脾和胃；半夏秫米汤引阳入阴；油桂米丸吞服，有引火归原之意。

（雒晓东 孙其新.李可医案处方集.北京：人民军医出版社.2012，83-84）

2.9 失眠5

程某，男，54岁。2009年10月8日。

劳倦内伤，心肾交虚，治中。

生半夏、茯苓各50g，白术、晒参、五灵脂、干姜各90g，秫米50g，炙甘草120g，制附片45g，油桂（米丸吞）3g。5剂。

【编按】劳倦伤中，以附子理中汤补火生土；因脾虚泻泄，

2. 心脑血管系统医案 ————— 83

加参灵散、四君子健脾和胃；半夏秫米汤引阳入阴；油桂米丸吞服，有引火归原之意。