

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає оперативну інформацію щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області за період з 28 липня по 03 серпня 2023 року.

Кукурудза – цвітіння, молочна стиглість. Соя – цвітіння, формування бобів. Цукрові буряки – ріст коренеплодів. Соняшник – цвітіння. Картопля – досягання. Сад – ріст плодів.

Протягом звітного періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

В посівах кукурудзи злаковими попелицями в середній чисельності 8 екз. на заселену рослину заселено і пошкоджено 7 % рослин на 75 % обстежених площ, злаковими блішками в середній чисельності 5 екз. на кв.м пошкоджено 10 % рослин на 24 % обстежених площ, гусеницями бавовникової совки за середньої чисельності 0,7 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 55 % обстежених площ, яйцекладками стеблового метелика в середній чисельності 1 шт. на рослину в середньому заселено 2 % рослин на 15 % обстежених площ, гусеницями стеблового метелика в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 46 % обстежених площ, гусеницями лучного метелика в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 8 % обстежених площ, польовими клопами в середній чисельності – 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено – 2 % рослин на 18 % обстежених площ. Пухирчастою сажкою в середньому уражено 1 % рослин (на качанах – 95, на стеблах – 5 %) на 18 % обстежених площ, летючою сажкою в середньому уражено 1 % рослин (на волоті ) на 13 % обстежених площ (737 га).

В посівах сої бульбочковими довгоносіками в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 8 % рослин на 32 % обстежених площ, люцерновим клопом в середній чисельності 0,3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 4 % рослин на 32 % обстежених площ. Септоріозом уражено 20 % рослин з розвитком хвороби 7 % на 30 % обстежених площ, аскохітозом уражено 7 % рослин з розвитком хвороби 5 % на 17 % обстежених площ, іржею уражено 5 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 38 % обстежених площ, пероноспорозом уражено 6 % рослин з розвитком хвороби 4 % на 17 % обстежених площ (328 га).

В посівах соняшнику геліхризовою попелицею в середній чисельності 6 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 3 % рослин на 32 % обстежених площ, гусеницями совки-гамма за середньої чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 7 % рослин на 8 % обстежених площ, гусеницями соняшникової вогнівки за середньої чисельності 1,7 екз. на рослину в середньому пошкоджено 4 % рослин на 10 % обстежених площ, польовими клопами за середньої чисельності 4 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 4 % рослин на 33 % обстежених площ. Фомозом уражено 9 % рослин з розвитком хвороби 5 % на 46 % обстежених площ, пероноспорозом уражено 3 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 14 % обстежених площ, септоріозом уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 29 % обстежених площ, альтернаріозом

уражено 3 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 21 % обстежених площ, білою гниллю уражено 0,5 % рослин (прикоренева форма 100 %) на 8 % обстежених площ (1053 га).

Колорадським жуком в середній чисельності 1 екз. на кущ заселено і пошкоджено 2 % кущів картоплі, яйцекладками в середній чисельності 1 шт. на кущ заселено 3 % кущів, личинками в середній чисельності 5 екз. на кущ заселено і пошкоджено 9 % кущів картоплі. Фітофторозом уражено 10 % рослин картоплі з розвитком хвороби 6 % (присадибні ділянки).

Фітофторозом уражено 10 % рослин томатів з розвитком хвороби 4 % (присадибні ділянки).

На присадибних ділянках у середній капусті капустяною попелицею в середній чисельності 15 екз. на заселену рослину пошкоджено 45 % рослин, хрестоцвітими блішками в середній чисельності 4 екз. на заселену рослину пошкоджено 40 % рослин, гусеницями капустяної совки в середній чисельності 1,1 екз. на заселену рослину пошкоджено 7 % рослин.

На присадибних ділянках у пізній капусті капустяною попелицею в середній чисельності 2 екз. на заселену рослину пошкоджено 8 % рослин, гусеницями капустяного білану в середній чисельності 2 екз. на заселену рослину пошкоджено 1 % рослин.

В плодovих садах яблуневою попелицею в середній чисельності 3 екз. на лист пошкоджено 5 % листків в середньому на 50 % дерев на 20 % площ, яблуневою плодожеркою гусеницями пошкоджено 4 % плодів в середньому на 10 % дерев на 100% площ. Паршею яблуні уражено 8 % листків з розвитком хвороби 5 % та 5 % плодів з розвитком хвороби 3 % на 28 % дерев на 100 % площ, плодовою гниллю в середньому уражено 8 % плодів падалиці під 60 % дерев на 80 % обстеженої площі (5 га).