Шрифт: Times New Roman, размер 14

Междустрочный интервал: 2

Выравнивание текста по левому краю

Нумерация литературных источников — по мере цитирования, а не в алфавитном порядке. Библиографические ссылки приводятся только на научные статьи и патенты (большинство не старше 5 лет) и в тексте даются арабскими цифрами в квадратных скобках.

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ

Поступила 00.00.0000 г.

Авторы

А.А. Иванова, к.м.н., младший научный сотрудник лаборатории оптической когерентной томографии НИИ экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий¹; младший научный сотрудник лаборатории высокочувствительных оптических измерений²;

И.И. Иванов, к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории регенеративной медицины³;

О.О. Иванов, д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории высокочувствительных оптических измерений²

¹Приволжский исследовательский медицинский университет; пл. Минина и Пожарского, 10/1, Н. Новгород, 603005;

²Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики им. А.В.

Гапонова-Грехова Российской академии наук, ул. Ульянова, 46, Н. Новгород,

603950;

³Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М.

Сеченова (Сеченовский Университет), ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2, Москва,

119991;

Аннотация

Цель исследования —

Материалы и методы.

Результаты.

Заключение.

Ключевые слова: фракционный СО₂-лазер; мультимодальная оптическая

когерентная томография; коэффициент затухания ОКТ-сигнала.

Колонтитул:

Для контактов: Александра Алексеевна Иванова, e-mail: <u>aai@yandex.ru</u>,

+7 920 001 00 11

Article Title

Received 00.00.0000

Authors

A.A. Ivanova, MD, PhD, Junior Researcher, Laboratory of Optical Coherence Tomography, Research Institute of Experimental Oncology and Biomedical Technologies¹; Junior Researcher, Laboratory of Highly Sensitive Optical Measurements²;

I.I. Ivanov, PhD, Senior Researcher, Laboratory of Regenerative Medicine³;

O.O. Ivanov, DSc, Leading Researcher, Laboratory of Highly Sensitive Optical Measurements²

¹Privolzhsky Research Medical University, 10/1 Minin and Pozharsky Square, Nizhny Novgorod, 603005, Russia;

²A.V. Gaponov-Grekhov Institute of Applied Physics of the Russian Academy of Sciences, 46 Ulyanov St., Nizhny Novgorod, 603950, Russia;

³I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), 8/2 Trubetskaya St., Moscow, 119991, Russia

The aim of the study is

Materials and Methods.

Results.

Conclusion.

Key words: fractional CO2 laser; multimodal optical coherence tomography; OCT signal attenuation coefficient.

H	A	Λ	t.		r	•
T,	v	v	υ	C.	L	•

Цель исследования —
Материалы и методы
Статистическая обработка данных
Результаты
Обсуждение
Заключение
Финансирование.
Конфликт интересов.
Рисунки и таблицы
Пример оформления подрисуночной подписи:
Рис. 1. Интравитальная конфокальная микроскопия с поверхности коры
больших полушарий через внутричерепное окно на 6-е сутки:
a , δ — совмещенные изображения; ϵ — колокализация сигнала от eGFP/FoxP3 $^+$
и поверхностного маркера CD45; ε , ∂ — участок инвазии глиомных клеток,
окруженный $CD45^+$ иммунными клетками. Доля $eGFP^+$ клеток составляет 5% .

Красный канал — сигнал от mScarlet (клетки опухоли); зеленый канал — eGFP (FoxP3⁺ Treg, указано стрелками); синий канал — пул CD45⁺ лейкоцитов

Литература

- 1. Gubarkova E., Potapov A., Moiseev A., Kiseleva E., Krupinova D., Shatilova K., Karabut M., Khlopkov A., Loginova M., Radenska-Lopovok S., Gelikonov G., Grechkanev G., Gladkova N., Sirotkina M. Depth-resolved attenuation mapping of the vaginal wall under prolapse and after laser treatment using cross-polarization optical coherence tomography: a pilot study. *Diagnostics (Basel)* 2023; 13(22): 3487, https://doi.org/10.3390/diagnostics13223487.
- 2. Lu L., Sun J., Su H., Luo S., Chen J., Qiu S., Chi Y., Lin J., Xu X., Zheng D. Antitumor CD8 T cell responses in glioma patients are effectively suppressed by T follicular regulatory cells. *Exp Cell Res* 2021; 407(2): 112808, https://doi.org/10.1016/j.yexcr.2021.112808.