

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає оперативну інформацію щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області за період з 08 по 14 липня 2022 року.

Кукурудза - викидання волоті, цвітіння. Соняшник – утворювання суцвіть-початок цвітіння. Соя - цвітіння. Картопля – цвітіння. Сад – формування плодів.

Протягом звітнього періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

В посівах кукурудзи злаковими попелицями в середній чисельності 13 екз. на заселену рослину заселено і пошкоджено 10 % рослин на 58 % обстежених площ, злаковими блішками в середній чисельності 7 екз. на кв.м пошкоджено 11 % рослин на 63 % обстежених площ, гусеницями бавовникової совки в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 47 % обстежених площ, польовими клопами в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 4 % обстежених площ, яйцекладками стеблового метелика в середній чисельності 1 шт. на рослину в середньому заселено 2 % рослин на 32 % обстежених площ, гусеницями стеблового метелика в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 0,5 % рослин на 23 % обстежених площ. Гельмінтоспориозом уражено 3 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 4 % обстежених площ, іржею уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 4 % обстежених площ, септоріозом уражено 8 % рослин з розвитком хвороби 3 % на 6 % обстежених площ (1149 га).

В посівах соняшнику гусеницями совки-гамма в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 35 % обстежених площ, гусеницями бавовникової совки в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 5 % рослин на 17 % обстежених площ, буряковою попелицею за середньої чисельності 9 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено 8 % рослин на 12 % обстежених площ, геліхризною попелицею за середньої чисельності 9 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено 4 % рослин на 40 % обстежених площ, личинками коника зеленого в середній чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 2 % обстежених площ, яйцекладками соняшникової вогнівки в середній чисельності 1 шт. на рослину в середньому заселено 4 % рослин на 17 % обстежених площ, польовими клопами за середньої чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 10 % обстежених площ. Септоріозом уражено 12 % рослин з розвитком хвороби 10 % на 8 % від обстежених площ, пероноспорозом уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 42 % обстежених площ, фомозом уражено 5 % рослин з розвитком хвороби 3 % на 41 % обстежених площ, фомопсисом уражено 3 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 4 % обстежених площ, іржею уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 2 % обстежених площ, білою гниллю уражено 2 % рослин

(прикоренева форма – 45 %, стеблова форма – 55 %) на 14 % обстежених площ (2024 га).

В посівах сої бульбочковими довгоносиками в середній чисельності 0,7 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 42 % обстежених площ, люцерновим клопом в середній чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2% рослин на 42 % обстежених площ, гусеницями лучного метелика в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 3 % обстежених площ. Аскохітозом уражено 5 % рослин з розвитком хвороби 3 % на 18 % обстежених площ, пероноспорозом уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 6 % обстежених площ, септоріозом уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 40 % обстежених площ (425 га).

Колорадським жуком в середній чисельності 1,2 екз. на кущ заселено і пошкоджено 4 % кущів картоплі, яйцекладками в середній чисельності 1 шт. на рослину в середньому заселено 1 % кущів, личинками в середній чисельності 1,1 шт. на кущ в середньому заселено 2 % кущів. Фітофторозом уражено 10 % кущів з розвитком хвороби 8 % (присадибні ділянки).

Фітофторозом уражено 5 % рослин томату з розвитком хвороби 3 % (присадибні ділянки).

На присадибних ділянках у середній капусті капустиною попелицею в середній чисельності 15 екз. на заселену рослину пошкоджено 27 % рослин, гусеницями капустиної совки в середній чисельності 1,1 екз. на заселену рослину пошкоджено 2 % рослин, хрестоцвітими блішками в середній чисельності 4 екз. на заселену рослину пошкоджено 34 % рослин, білокрилкою в середній чисельності 15 екз. на заселену рослину пошкоджено 30 % рослин.

На присадибних ділянках у пізній капусті білокрилкою в середній чисельності 15 екз. на заселену рослину пошкоджено 20 % рослин, капустиною попелицею в середній чисельності 9 екз. на заселену рослину пошкоджено 8 % рослин, капустиною міллю в середній чисельності 2 екз. на заселену рослину пошкоджено 2 % рослин.

В плодових садах яблуневою плодожеркою гусеницями пошкоджено 6 % плодів в середньому на 40 % дерев, яблуневою попелицею в середній чисельності 5 екз. на лист пошкоджено 7 % листків в середньому на 40 % дерев. Паршею яблуні уражено 7 % листків з розвитком хвороби 4 % та 4 % плодів з розвитком хвороби 2 % на 20 % дерев на 100 % площ, плодовою гниллю в середньому уражено 2 % плодів падалиці під 20 % дерев на 100 % обстеженої площі (4 га).