

Ревматология

1. Ревматическая лихорадка вызывается:

- а) стафилококком;
- б) β -гемолитическим стрептококком группы С;
- в) пневмококком;
- г) β -гемолитическим стрептококком группы А;
- д) возбудитель неизвестен.

2. Наиболее типичными признаками ревматической лихорадки являются:

- а) малая хорея;
- б) «летучий» артрит;
- в) кольцевидная эритема;
- г) узловатая эритема.

3. После перенесенной стрептококковой инфекции ревматическая лихорадка возникает через:

- а) 1–2 года;
- б) 2–3 нед.;
- в) 4 дня;
- г) 5 мес.;
- д) 6 нед.

4. Для ревматического полиартрита характерны:

- а) стойкая деформация суставов;
- б) нестойкая деформация суставов;
- в) поражение крупных и средних суставов;
- г) легучесть болей;
- д) исчезновение боли после приема НПВП.

5. При ревматоидном артрите чаще всего поражаются суставы:

- а) позвоночника;
- б) коленные;
- в) проксимальные межфаланговые;
- г) крестцово-подвздошное сочленение;
- д) дистальные межфаланговые.

6. При каком осложнении ревматоидного артрита анализ мочи является информативным тестом?

- а) синдром Хаммена–Рича;
- б) перикардит;
- в) амилоидоз;
- г) дигитальный ангиит.

7. Лабораторными признаками активности ревматоидного артрита являются:

- а) повышение уровня СРБ;
- б) ускорение СОЭ;
- в) повышение уровня ЛДГ;
- г) лейкоцитоз;
- д) титр АСЛ-О.

8. Паннус – это:

- а) агрессивная грануляционная ткань;
- б) утренняя скованность больше 1 ч;
- в) повышение АЛТ;
- г) узелок Гебердена;
- д) высокий титр АСЛ-О.

9. Об активности ревматоидного артрита свидетельствуют:

- а) ускорение СОЭ;
- б) утренняя скованность больше 1 ч;
- в) повышение АЛТ;
- г) узелки Гебердена;
- д) высокий титр АСЛ-О.

10. Скованность при ревматоидном артрите возникает после периода:

- а) активности;
- б) покоя.

11. При ревматоидном артрите обычно возникают:

- а) радиальные девиации;
- б) ульнарные девиации.

12. При ревматоидном артрите поражаются:

- а) верхняя часть шейного отдела позвоночника;
- б) нижняя часть шейного отдела позвоночника;
- в) шейный отдел никогда не поражается.

13. Характерными лабораторными признаками болезни Рейтера являются:

- а) ревматоидный фактор;
- б) повышение СОЭ;
- в) обнаружение хламидий в соскобе из уретры;
- г) протеинурия;
- д) анемия.

14. Для генерализованного остеоартроза не характерно поражение:

- а) дистальных межфаланговых суставов;
- б) проксимальных межфаланговых суставов;
- в) лучезапястных суставов;
- г) коленных суставов.

15. Для остеоартроза характерны:

- а) механические боли;
- б) хруст в суставе;
- в) повышение кожной температуры над суставом;
- г) припухлость сустава;
- д) гиперпигментация кожи над пораженным суставом.

16. Факторами, приводящими к развитию остеоартроза, являются:

- а) дисплазия суставов;
- б) эндокринные нарушения;
- в) функциональная перегрузка с микротравматизацией;
- г) наследственное снижение резистентности хряща к обычным нагрузкам;
- д) частое или хроническое воспаление сустава.

17. Укажите суставы, наиболее часто поражаемые при остеоартрозе:

- а) дистальные межфаланговые;
- б) проксимальные межфаланговые;
- в) I запястно-пястные;
- г) тазобедренные;
- д) локтевые;
- е) коленные;
- ж) пястно-фаланговые;

- з) позвоночника;
- и) крестцово-подвздошные сочленения;
- к) голеностопные.

18. Как правило, боли при остеоартрозе:

- а) стихают в покое;
- б) усиливаются после нагрузки;
- в) уменьшаются на фоне нагрузки;
- г) «стартовые».

19. При остеоартрозе вариантами болевого синдрома могут быть все, кроме:

- а) утренней скованности более 1 ч;
- б) «стартовых» болей;
- в) ночных болей, обусловленных внутрикостной гипертензией;
- г) болей при механической нагрузке;
- д) болей, связанных с блокадой сустава.

20. К клиническим проявлениям остеоартроза относятся:

- а) крепитация при движениях;
- б) утренняя скованность менее 30 мин;
- в) утренняя скованность не менее 1 ч;
- г) энтезопатии;
- д) деформации суставов;
- е) ограничение подвижности в суставах.

Ответы

1 – г. 2 – а, б, в. 3 – б. 4 – в, г, д. 5 – в. 6 – в. 7 – а, б. 8 – а. 9 – а, б. 10 – б. 11 – б. 12 – а. 13 – б, в. 14 – в. 15 – а, б. 16 – а, б, в, г, д. 17 – а, г, е, з. 18 – а, б, г. 19 – а, в. 20 – а, б, д, е.