

На виконання наказу Держпродспоживслужби від 17 червня 2016 року № 159 «Про забезпечення виконання основних напрямків державної інформаційної політики у сфері захисту рослин, надання інформації щодо діяльності управлінь Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в областях» Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає інформаційне повідомлення щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області станом на 26 жовтня 2023 року.

В Олександрійському (Петрівському) районі в посівах озимої пшениці (225 га) гусеницями озимої совки в середній чисельності – 0,5, максимально – 1 екз. на кв.м пошкоджено 1 % рослин в сильному ступені.

У фази сходи-початок куціння проводять суцільні обробки посівів після колосових попередників проти личинок хлібної жужелиці у фази сходи-3-й листок за чисельності 1-2 екз. на кв.м, на початку куціння – 2-3 екз. на кв.м і більше інсектицидами згідно з «Державним реєстром пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» в 2023 році, (далі – Державний реєстр).

В Олександрійському (Олександрійський) районі хрестоцвітими блішками в середній чисельності – 3, максимально – 6 екз. на кв.м в середньому пошкоджено – 4 % рослин озимого ріпаку (159 га) в слабкому ступені.

Несправжніми гусеницями ріпакового пильщика в середній чисельності - 0,7, максимально – 1 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 3 % рослин в слабкому ступені на 120 га озимого ріпаку з 329 га обстежених.

Гусеницями ріпакового білану в середній чисельності 3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 4 % рослин на 60 га озимого ріпаку з 329 га обстежених.

В Олександрійському (Олександрійський) районі гусеницями озимої совки в середній чисельності – 0,5, максимально – 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин озимого ріпаку (225 га) в сильному ступені.

В Голованівському (Гайворонському) та Кропивницькому (Олександрівський) районах капустяною попелицею в середній чисельності 7 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 4 % рослин озимого ріпаку (120 га) в слабкому ступені.

В Кропивницькому (Бобринецький) районі альтернаріозом в середньому уражено 5 % рослин озимого ріпаку з середнім розвитком хвороби 3 % на 70 га з 154 га обстежених.

На площах озимої пшениці (352 га) середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 1,4, максимально – 5 на га, в середньому – 4, максимально – 5 нир на колонію. На площах озимого ріпаку середня чисельність колоній мишоподібних гризунів 1 на га, в середньому 2 нори на колонію на 8 % обстеженої площі 329 га. На площах з-під кукурудзи (180 га) середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 2, максимально – 3 на га, в

середньому – 5, максимально – 7 нір на колонію. На площах з-під соняшнику (46 га) середня чисельність колоній шкідника – 2 на га, в середньому 6 нір на колонію.

З метою запобігання збільшення чисельності та шкідливості мишоподібних гризунів слід проводити постійний моніторинг їх розвитку та профілактичні заходи щодо зменшення чисельності шкідників: глибока оранка полів, знищення гризунів у місцях резервацій з метою недопущення розселення їх у посіви озимих сільськогосподарських культур. За наявності 3-5 і більше жилих колоній на гектарі необхідно застосовувати родентициди, дозволені до використання Державним реєстром. З метою охорони навколишнього середовища перевагу надавати біологічному методу боротьби.