

Що таке хіб-інфекція?

Це група захворювань, викликана бактерією Hib (Haemophilus influenzae типу b), також відомою як гемофільна паличка. Найбільш небезпечними ці захворювання є для дітей до 5 років: вони можуть призвести до життєвої інвалідизації і навіть смерті.

Які симптоми хвороби?

Оскільки хіб-інфекція викликає цілу низку захворювань, симптоми залежать від того, який орган чи систему уражено.

Одним із найпоширеніших захворювань, які спричиняє бактерія хіб, є хіб-менінгіт (інфекція оболонки головного та спинного мозку). Його симптоми такі:

лихоманка

- головний біль чи ригідність потиличних м'язів
- нудота з блюванням чи без
- підвищена чутливість до світла
- сплутана свідомість
- відмова від їжі та пиття, знижена реакція на зовнішні подразники чи дратівливість (у дітей)

Хіб-інфекція також може спричиняти такі захворювання:

- пневмонію (запалення легень)
- епіглотит (набряк надгортанника, що швидко призводить до обструкції дихальних шляхів та суттєво ускладнює дихання)
- бактеріємію (інфекцію крові)
- септичний артрит (запалення суглобів)
- целюліт (запалення сполучної тканини в шкірі)
- отит (запалення вух)
- перикардит (запалення зовнішньої оболонки серця)

Як можна заразитися?

Бактерії Hib локалізуються в носоглотці та можуть передаватися іншим людям повітряно-крапельним шляхом: коли інфікована особа чхає, кашляє чи просто розмовляє з вами з близької відстані (менше 1,5 м). Особи, що не мають симптомів захворювання, але є носіями бактерії, також можуть заражати інших. Саме так хіб-інфекція й поширюється.

Наскільки це захворювання небезпечне?

Хіб-інфекція є надзвичайно небезпечною. Більшість захворілих дітей потребують госпіталізації. За статистикою, від 3 до 6% всіх випадків гемофільної інфекції типу b у дітей є фатальними. Навіть за умови вчасного лікування 1 з 20 дітей, що захворіли на одне з захворювань, яке викликає гемофільна паличка – хіб-менінгіт – помирає. 1 з 5 дітей, що переохворіли на хіб-менінгіт, страждатимуть від таких її наслідків як ушкодження мозку чи глухота.

Як захиститися від хіб-інфекції?

Єдиною ефективною профілактикою цього смертельно небезпечного для дітей захворювання є вакцинація.

Вакцинація від хіб-інфекції проводиться до віку 5 років (якщо дитина “наздоганяє” календар і починає вакцинацію після 12 місяців, то для неї достатньо однієї дози).

Після 5 років від гемофільної інфекції вакцинують лише окремі групи медичного ризику.