

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає оперативну інформацію щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області за період з 27 червня по 03 липня 2025 року.

Озима пшениця, озимий ячмінь –воскова стиглість, повна стиглість. Цукрові буряки – ріст коренеплода. Кукурудза, соняшник, соя – листоутворення. Картопля - цвітіння. Сад – ріст плодів

Протягом звітнього періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

В посівах озимої пшениці злаковими попелицями в середній чисельності 3 екз. на заселену рослину в середньому заселено та пошкоджено 4 % рослин на 8 % обстеженої площі, хлібними жуками в середній чисельності 4 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 20 % обстежених площ. Септоріозом уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 3% на 7 % обстежених площ (1734 га).

В посівах кукурудзи злаковими блішками за середньої чисельності 6 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 6 % рослин на 55 % обстежених площ, злаковими попелицями в середній чисельності 14 екз. на заселену рослину в середньому заселено та пошкоджено 6 % рослин на 67 % обстеженої площі, гусеницями озимої совки в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 15 % обстежених площ. Гельмінтоспоріозом уражено 1 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 12 % обстеженої площі, летючою сажкою уражено 1 % рослин (стеблова форма) на 12 % обстеженої площі (1009 га).

В посівах сої бульбочковими довгоносіками в середній чисельності 4 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 100 % обстежених площ, гусеницями совки-гамма в середній чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 64 % обстежених площ. Фомозом уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 23 % обстеженої площі (220 га).

В посівах цукрових буряків буряковою попелицею в середній чисельності 8 екз. на заселену рослину в середньому заселено та пошкоджено 5 % рослин на 30 % обстеженої площі (430 га).

В посівах соняшнику гусеницями лучного метелика в середній чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 4 % обстежених площ, гусеницями совки-гамма в середній чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 18 % обстежених площ, буряковою попелицею в середній чисельності 9 екз. на заселену рослину в середньому заселено та пошкоджено 4 % рослин на 51 % обстеженої площі. Пероноспорозом уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 38 % обстеженої площі, септоріозом уражено 15 % рослин з розвитком хвороби 13 % на 8 % обстеженої площі, фомозом уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 16 % обстеженої площі (1717 га).

На присадибних ділянках у середній капусті капустяною попелицею в середній чисельності 10 екз. на заселену рослину пошкоджено 20 % рослин,

капустяною білокрилкою в середній чисельності 15 екз. на заселену рослину пошкоджено 80 % рослин, хрестоцвітими блішками в середній чисельності 2 екз. на заселену рослину пошкоджено 30 % рослин.

Колорадським жуком в середній чисельності 1 екз. на кущ заселено і пошкоджено 1 % кущів картоплі, яйцекладками в середній чисельності 1 шт. на рослину в середньому заселено 2 % кущів, личинками в середній чисельності 2 шт. на кущ в середньому заселено 1 % кущів. Фітофторозом уражено 4 % кущів картоплі з розвитком хвороби 2 % (присадибні ділянки).

Фітофторозом уражено 2 % рослин томатів з розвитком хвороби 1 % (присадибні ділянки).

В плодових садах яблуневою попелицею в середній чисельності 3,5 екз. на лист пошкоджено 3 % листків в середньому на 40 % дерев, яблуневою плодожеркою гусеницями пошкоджено 2 % плодів в середньому на 30 % дерев на 100 % площ. Парша уражено 4 % листків з розвитком хвороби 2 % та 2 % плодів з розвитком хвороби 1% на 30 % дерев, плодовою гниллю в середньому уражено 1 % плодів падалиці під 20 % дерев на 100 % обстеженої площі (4 га).