

التمرين الأول: (05 نقاط)

نعتبر المتتالية (U_n) المعرفة بـ: $U_0 = 1$ و من أجل كل عدد طبيعي n : $U_{n+1} = \sqrt{2U_n}$

(1) الجدول التالي يعطي قيم تقريبية لبعض حدود المتتالية (U_n)

n	1	5	10	15	20
U_n	1,4142	1,9571	1,9986	1,9999	1,9999

• ضع تخميناً حول اتجاه تغير المتتالية (U_n) وتقاربها

(2)

(1) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $1 < U_n \leq 2$

(2) عين اتجاه تغير المتتالية (U_n) على N

(5) برهن أن المتتالية (U_n) متقاربة ثم أحسب نهايتها.

(3) نعتبر المتتالية (V_n) المعرفة على N كما يلي: $V_n = \ln \ln(U_n) - \ln \ln 2$

(1) برهن أن (V_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ ثم عين حدها الأول.

(2) أكتب عبارة الحد العام n بدلالة n ثم استنتج عبارة الحد العام U_n بدلالة n

(5) عين نهاية المتتالية: (U_n)

(6) أحسب بدلالة n المجموع $S_n = V_0 + V_1 + \dots + V_n$ حيث:

التمرين الثاني: (04 نقاط)

تحتوي علبة على 7 كرات لا نفرق بينها باللمس 4 منها تحمل الرقم 1 و كرتان تحملان الرقم 2 و كرة واحدة تحمل الرقم 0 . نسحب ثلاث كرات في آن واحد

(1) أحسب احتمال الحوادث التالية

(1) A: "الكرات المسحوبة تحمل نفس الرقم"

(2) B: "يوجد في الكرات المسحوبة الرقم 0"

(3) C: "مجموع الأرقام المسحوبة يساوي 3"

(2) X هو المتغير العشوائي الذي يرفق بعملية السحب مجموع الأرقام المسحوبة

(1) أكتب قانون الاحتمال للمتغير العشوائي

(3) نسحب الآن من الكيس ثلاث كرات على التوالي و دون إرجاع الكرة المسحوبة إلى الكيس و

نسجل بالأرقام عددا طبيعيا رقم أحاده هو الرقم المسحوب ثالثا و رقم عشراته هو الرقم المسحوب
ثانيا و رقم مئاته هو الرقم المسحوب أولا.

(1) أحسب احتمال الحصول على رقم زوجي. (يمكن الاستعانة بشجرة الاحتمالات)

(2) أحسب احتمال الحصول على رقم يقبل القسمة

على 5

التمرين الثالث: (07 نقاط)

1. في الشكل المقابل () هو المنحنى الممثل للدالة g
المعرفة على R بـ:

$$g(x) = (ax + b)e^x + c$$

حيث: a و b و c أعداد حقيقية

(1) بقراءة بيانية:

(1) عين (x) ثم استنتج قيمة c

(2) عين نهاية الدالة g عند $+\infty$

(3) عين كلا من $g(0)$ و $g'(0)$ ثم استنتج قيمتي a و b

(2) نفرض فيما يأتي: $g(x) = (x - 1)e^x - 1$

(1) شكل جدول تغيرات الدالة g

(2) بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α محصور بين 1, 2 و 1, 3 ثم استنتج إشارة

$g(x)$

II. نعتبر الدالة f المعرفة على R كما يلي: $f(x) = \frac{x}{x+1}$ و ليكن (C_f) تمثيلها البياني في

المستوي المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$

(1) أحسب نهايات الدالة f عند $-\infty$ و $+\infty$ ثم فسر النتيجة بيانيا

(2) بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x$ هو مستقيم مقارب مائل لـ: (C_f) بجوار $+\infty$. ثم

ادرس الوضعية النسبية بين (C_f) و (Δ)

(3) ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها (لاحظ أن: $f'(x) = \frac{-g(x)}{(e^x+1)^2}$)

(4) بين أن: $f(\alpha) = \alpha - 1$ ثم استنتج حصرا لـ: $f(\alpha)$

(5) أنشئ المستقيم (Δ) و المنحني (C_f) في المستوي المنسوب إلى المعلم $(O, \vec{i}, \vec{j})$

(6) ناقش بيانيا و حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة: $f(x) = f(m)$

التمرين الرابع: (04 نقاط)

في المستوي المركب المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O, \vec{u}, \vec{v})$ نعتبر النقط $D; C; B; A$ التي

لواحقها على الترتيب: $Z_A = \sqrt{3} + i$ و $Z_B = -\sqrt{3} - i$ و $Z_C = 2i$ و $Z_D = -1 + \sqrt{3}i$

(1) أنشئ في المعلم $(O, \vec{u}, \vec{v})$ النقط $D; C; B; A$ مع شرح كيفية الإنشاء

(2) عين I لاحقة النقطة I منتصف قطعة المستقيم $[BA]$

(3) عين E لاحقة النقطة E مركز الدائرة المحيطة بالمثلث CAB

(4) عين مجموعة النقط M ذات اللاحقة Z في كل حالة:

$$|iZ + 2| = |Z - i - \sqrt{3}| \bullet$$

$$|Z + \sqrt{3} + i| = \sqrt{3} \bullet$$

(5) أكتب العدد المركب $\frac{Z_B}{Z_C}$ على الشكل المثلثي ثم استنتج طبيعة المثلث COB

(6) أحسب $(Z_D)^{2015}$ (تعطى النتيجة على الشكل الجبري)

(7) أعط تفسيراً لطويلة و عمدة العدد المركب: $\frac{Z_B - Z_A}{Z_C - Z_A}$

