

TEST : RESTAURACIÓN DE AMALGAMA

1. ¿Qué instrumento se utiliza inicialmente para eliminar la caries?
 - A. Cucharilla
 - B. Turbina con fresa de carburo de tungsteno
 - C. Bruñidor
 - D. Mandril
2. ¿Qué instrumento se emplea para la eliminación manual de caries?
 - A. Cucharilla
 - B. Portaamalgamas
 - C. Hollemback
 - D. Conformador de surcos
3. ¿Qué elemento se utiliza para ajustar la matriz en cavidades clase II?
 - A. Mandril
 - B. Cuñas de madera
 - C. Papel articular
 - D. Portaamalgamas
4. ¿Qué protector dentinopulpar se coloca en una cavidad profunda?
 - A. Ninguno
 - B. CIV únicamente
 - C. Hidróxido de calcio + CIV/ZOE
 - D. Solo ZOE
5. ¿Qué equipo se utiliza para preparar la amalgama?
 - A. Lámpara de fotopolimerización
 - B. Vibradora de amalgama
 - C. Autoclave
 - D. Contraángulo
6. ¿En qué recipiente se vierte la amalgama tras el batido?
 - A. Portaamalgamas
 - B. Vaso Dappen
 - C. Jeringa carpule
 - D. Bandeja de instrumental
7. ¿Qué instrumento se utiliza para introducir la amalgama en la cavidad?
 - A. Bruñidor
 - B. Portaamalgamas
 - C. Hollemback
 - D. Cucharilla
8. ¿Qué instrumento se usa para condensar la amalgama?
 - A. Atacador
 - B. Conformador de surcos
 - C. Cleoide
 - D. Mandril
9. ¿Qué se realiza tras la sobreobtención de la cavidad?
 - A. Fotopolimerización
 - B. Modelado y bruñido
 - C. Colocación de matriz
 - D. Grabado ácido

10. ¿Qué instrumento se utiliza para tallar surcos anatómicos en la amalgama?
 - A. Bruñidor
 - B. Conformador de surcos
 - C. Atacador
 - D. Mandril
11. ¿Qué instrumento se utiliza para recortar la amalgama cuando empieza a endurecer?
 - A. Hollemback
 - B. Cleoide-discoide
 - C. Bruñidor
 - D. Portaamalgamas
12. ¿Con qué se comprueba la oclusión tras la restauración?
 - A. Fresa de diamante
 - B. Papel articular
 - C. Mandril
 - D. Matriz metálica
13. ¿Cuándo debe realizarse el pulido de la amalgama?
 - A. Inmediatamente después de colocarla
 - B. A los 10 minutos
 - C. Tras 24 horas
 - D. A la semana
14. ¿Qué instrumentos se utilizan para el pulido tardío?
 - A. Cucharilla y bruñidor
 - B. Fresas milhojas y copas de silicona
 - C. Portaamalgamas y mandril
 - D. Hollemback y conformador
15. ¿Qué recomendación debe darse al paciente tras una restauración de amalgama?
 - A. Masticar fuerte inmediatamente
 - B. No comer durante 12 horas
 - C. No masticar con fuerza por ese lado durante 48 horas
 - D. Evitar bebidas frías durante una semana