



PROTOCOLO N°61

SOSPECHA DE CONTAGIO DE ESCABIOSIS (SARNA)

1. Objetivo

Establecer medidas claras para la detección, manejo y prevención de casos de escabiosis en la comunidad educativa, minimizando el riesgo de contagio.

2. Identificación de Casos Sospechosos

- **Síntomas principales:**
 - Picazón intensa, especialmente nocturna.
 - Lesiones en la piel como pápulas, vesículas o surcos lineales.
 - Presencia de pequeñas líneas curvas en la piel (túneles acarinos).
- **Acción inmediata:**
 - Notificar al encargado de salud escolar o al director del establecimiento.
 - Aislar temporalmente al estudiante o personal afectado para evitar contacto directo con otros.

3. Comunicación

- Informar a los padres o apoderados del estudiante afectado sobre la sospecha y la necesidad de evaluación médica.
- En caso de confirmación, comunicar a la comunidad educativa de manera general, respetando la confidencialidad del caso.

4. Medidas de Higiene y Prevención

- Lavar ropa, sábanas y toallas del afectado con agua caliente (mínimo 60°C) y secar a alta temperatura.
- Desinfectar superficies y objetos de uso común en el aula.
- Evitar compartir objetos personales como peines, ropa o toallas.

5. Manejo de Casos Confirmados

- El estudiante o personal diagnosticado debe iniciar tratamiento médico y permanecer en aislamiento hasta 24 horas después de comenzar el tratamiento.
- Solicitar un certificado médico que confirme la recuperación antes de reincorporarse a la escuela.

6. Seguimiento y Control

- Si se detectan dos o más casos confirmados, notificar al Servicio de Salud correspondiente para recibir orientación adicional.
- Realizar charlas educativas sobre la escabiosis, su transmisión y prevención.

7. Revisión del Protocolo

- Evaluar la efectividad del protocolo después de cada caso o brote y realizar ajustes si es necesario.