BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG
KHOA DƯỢC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2023

THÔNG TIN THUỐC

V/v: Hướng dẫn sử dụng **Dobutamin**

I. Chỉ định:

- Tăng co cơ tim trong suy tim cấp
- Sốc nhiễm khuẩn

II. Liều dùng:

Liều dùng tuân theo hướng dẫn điều trị Bệnh viện Hùng Vương

III. Cách dùng:

- Đường dùng: Truyền tĩnh mạch
- Cách pha: Pha loãng 20 ml dung dịch đậm đặc với ***ít nhất 50 ml*** dung dịch NaCl 0.9%, dextrose 5% hoặc Ringer lactate. Dung dịch tiêm truyền phải được sử dụng trong vòng 24 giờ.

IV. Phụ nữ mang thai và cho con bú:

- Phụ nữ mang thai: Dữ liệu trên người hạn chế – Dữ liệu trên người gợi ý nguy cơ thấp
- Phụ nữ cho con bú: Không có dữ liệu trên người – Có thể tương thích

V. Lưu ý:

Không được trộn lẫn Dobutamin với dung dịch Natri bicarbonate 5% hoặc bất kỳ dung dịch kiềm mạnh nào khác.

VI. Tên một số sản phẩm sử dụng tại Bệnh viện Hùng Vương:

Dobutamin-hameln 12,5mg/ml

Tài liệu tham khảo:

1) *Dược thư Quốc Gia Việt Nam 2022*
2) *Drugs in Pregnancy and Lactation*
3) *HDSD của nhà sản xuất*

Tổ TTT-Dược lâm sàng **Khoa Dược**

Ds. Nguyễn Thanh Hoài Phong **Ds. Đoàn Thị Ngọc Hân**