BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG
KHOA DƯỢC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2023

THÔNG TIN THUỐC

V/v: Hướng dẫn sử dụng **Atropin**

I. Chỉ định:

- Điều trị triệu chứng co thắt cơ trơn ở đường tiêu hoá, đường mật, đường tiết niệu
- Giải độc trong trường hợp quá liều hay ngộ độc các thuốc có tác dụng ức chế acetylcholin esterase
- Nhịp tim chậm, tụt huyết áp trong hồi sức cấp cứu tim – phổi
- Tiền mê: Làm giảm phản ứng thần kinh phế vị khi đặt nội khí quản và thao tác phẫu thuật

II. Liều dùng:

- Tiêm: 0,4 - 0,6 mg. Nếu cần, có thể lặp lại cách nhau 4-6 giờ
- Nhịp tim chậm trong hồi sức cấp cứu tim phổi: 0,5 mg tiêm tĩnh mạch, liều có thể lặp lại cách nhau 3-5 phút, tổng liều tối đa 3 mg.

III. Cách dùng:

Tiêm tĩnh mạch

IV. Phụ nữ mang thai và cho con bú:

- Phụ nữ có thai: Dữ liệu trên người gợi ý nguy cơ
- Phụ nữ cho con bú: Dữ liệu trên người hạn chế - Có thể tương thích

V. Tên một số sản phẩm sử dụng tại Bệnh viện Hùng Vương:

- Atropin sulfat 0,25mg/1ml
- Atropin-BFS 0,25mg/ml

Tài liệu tham khảo:

1) *Dược thư Quốc Gia Việt Nam 2022*
2) *Drugs in Pregnancy and Lactation*

Tổ TTT-Dược lâm sàng **Khoa Dược**

Ds. Nguyễn Thanh Hoài Phong **Ds. Đoàn Thị Ngọc Hân**