

ІНСТРУКТИВНА КАРТКА № 32.

ТЕМА: Лікування корів при затриманні посліду. Надання допомоги новонародженим при затриманні меконію.

МЕТА: набути навиків в лікуванні корів із затриманням посліду і надання допомоги новонародженим при затриманні меконію.

ОБЛАДНАННЯ: хворі тварини, бинти, ножиці, мило, рушники, скальпелі.

ЗАВДАННЯ: 1. Лікування затримання посліду консервативними способами.

2. Лікування затримання посліду оперативними способами.

3. Лікування новонароджених при меконію.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ:

1. Консервативний спосіб спрямований на підвищення скорочувальної здатності м'язів матки і загального тонуусу. Корів лікують через 8 годин після родів.

-Введення всередину 3-5 літрів навколоплідних вод з повторенням через 2-8 годин.

-Введення всередину розчину цукру 2-3 рази через 8 годин.

-Ін'єкція в ділянці шиї 20 мл молозива підшкірно або дають в середину 2-3л.

-Ін'єкція в яремну вену 300 мл 40%- розчину глюкози і 150 мл 10%- розчинну кальцію хлориду.

-Підшкірна ін'єкція 30-40 ОД окситоцину, пітуїтрину.

2. Оперативно послід у корів виділяють через добу .Вульву і звисаючу частину посліду обмивають дезінфікуючим розчином. Підготовлену руку вводять в матку. Між вказівним і середнім пальцями захоплюють карбункула, а великим знімають котиледон . Після видалення посліду проводять ревізію матки, для витягування обірваних карбункулів і частини посліду. У матку вводять гінекологічні свічки, таблетки та інші антистатичні речовини.

3. Лікування затримання посліду:

Спочатку роблять не глибоку масляну або мильну клізму.

Первородний кал (меконій) із прямої кишки виділяють пальцем, змазаним маслом.

Після звільнення прямої кишки від калу новонародженому випоюють молозиво, дають в середину послаблюючі речовини (касторове масло 50 г. глауберова сіль 50-70 гр.).

Можна застосувати проносні речовини (рецинову олію, пурген).

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ: І.І.Карташов – практикум « Ветеринарне акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин».