

Hola a todos! La idea de este documento es que cada uno de uds. pueda aportar para dividir los tóxicos en relación a la signosintomatología que presentan. Es una buena forma para repasar, agruparlos y ayudar a pensar diagnósticos diferenciales y demás. Puede incluir también medidas de descontaminación o las categorías que se les ocurran...

Todos pueden editar el documento y agregar lo que consideren para enriquecerlo! (Les dejo unos primeros ejemplos!) Saludos! Jony

HEPATOTOXICIDAD

- Amanita Phalloides
- Aspirina (grave)
- Paracetamol
- Cromo en agudo
- Plomo en agudo
- Tetracloruro de carbono
- Acido Valpróico
- Tolueno crónico
- Xileno crónico
- Sales de Hierro

Nefrotoxicidad

- Tetracloruro de carbono
- Mercurio en agudo

PRESENTAN ACIDOSIS METABÓLICA CON ANIÓN GAP AUMENTADO

- Sales de Hierro
- Metanol
- Monóxido de carbono
- Cianuro
- Aspirina
- Etanol
- Metanol
- Etilenglicol
- Cocaína
- Escorpianismo (tityus trivittatus)
- Inhaladores crónicos de tolueno
- Extasis

DEPRESORES DEL SNC

- Opiodes
- Etanol
- Bzd
- Antidepresivos tricíclicos
- Ghb
- Benceno

- Tolueno
- Xileno
- Anis estrellado

POLINEUROPATIAS

- Etanol (mixta, simétrica, distal)
- N hexano (mixta, simétrica, distal)
- Plomo (clásicamente motora (actualmente en discusión si es mixta), simétrica, distal, indolora)
- Organofosforados (Motora, distal)
- Talio (sensitiva, dolorosa)
- Arsenico, HACRE (mixta, simétrica, distal)

TOXISINDROMES:

SIMPATICOMIMETICO.

- Cocaína
- Anfetaminas
- MDMA

Tóxicos que producen rabdomiolisis

- Organoclorados
- Monóxido de carbono
- Crotalus

Tóxicos que producen metahemoglobinemia

- Borraja
- Eucalipto
- Nitritos (agua de pozo, nitroprusiato de sodio, nitroglicerina)
- Nitratos
- Naftalina
- Anestésicos disociativos

Criterios de indicación de cámara hiperbárica

- Trastornos neurológicos: pérdida transitoria o prolongada de la conciencia, convulsiones, signos focales.
- Exploración cardiovascular o neurológicas claramente anormales.
- Acidosis grave
- Mayor de 36 años con exposición de más de 24 hs o con niveles de cohb mayor 25%
- Paciente embarazada sintomática o con cohb mayor a 20 %.

Causas de muerte por cocaína

- Cardiovascular: – Infarto – Crisis hipertensivas – Arritmias
- Cerebrales – Hemorragia – Infarto cerebral
- Hipertermia
- Disección aórtica

Acrodinia

estado que principalmente se observa en la [infancia](#), generalmente como consecuencia de la exposición crónica a compuestos de mercurio, que pueden producir encefalopatía y [polineuropatía](#). Las características clínicas incluyen [dolor](#), inflamación y decoloración rosada de los dedos de [manos](#) y [pies](#), debilidad de las extremidades, irritabilidad extrema, hiperestesia y alteraciones en el nivel de [conciencia](#)