

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає інформаційне повідомлення щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області станом з 22 по 28 серпня 2025 року.

Кукурудза – молочна-воскова, воскова стиглість. Соя – формування бобів. Соняшник – кінець цвітіння.

Протягом звітної періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

В посівах кукурудзи гусеницями стеблового (кукурудзяного) метелика в середній чисельності 1 екз. на заселену рослину в середньому заселено та пошкоджено 5 % рослин на 36 % обстежених площ, гусеницями бавовникової совки в середній чисельності 1,2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 55 % рослин на 28 % обстежених площ, польовими клопами за середньої чисельності 4 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 4 % рослин на 5 % обстежених площ. Пухирчастою сажкою в середньому уражено 2 % рослин (на качанах – 58, на стеблах – 38, на волоті – 4 %) на 41 % обстежених площ, летючою сажкою в середньому уражено 1 % рослин (на стеблі - 78 %, на волоті – 22 %) на 7 % обстежених площ, фузаріозом уражено 11 % качанів на 29 % обстежених площ, бактеріозом качанів уражено 2 % качанів з розвитком хвороби 1 % на 14 % обстежених площ (1243 га).

В посівах сої попелицями в середній чисельності 3 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 3 % рослин на 10 % обстежених площ, павутинним кліщем в середній чисельності 4 екз. на заселену листок в середньому заселено та пошкоджено 15 % рослин на 27 % обстежених площ. Аскохітозом уражено 10 % рослин з розвитком хвороби 7 % на 37 % обстежених площ, септоріозом уражено 9 % рослин з розвитком хвороби 5 % на 68 % обстежених площ (202 га).

В посівах соняшнику гусеницями бавовникової совки в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 34 % рослин на 57 % обстежених площ, гусеницями совки-гамма в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 12 % рослин на 1 % обстежених площ, гусеницями лучного метелика в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 10 % рослин на 1 % обстежених площ, гусеницями соняшникової вогнівки за середньої чисельності 1 екз. на кошик в середньому заселено і пошкоджено 5 % рослин на 24 % обстежених площ, геліхризною попелицею в середній чисельності 11 екз. на заселену рослину в середньому заселено та пошкоджено 9 % рослин на 12 % обстеженої площі, польовими клопами за середньої чисельності 5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 4 % рослин на 10 % обстежених площ. Пероноспорозом уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 4 % на 7 % обстежених площ, фомозом уражено 8 % рослин з розвитком хвороби 5 % на 62 % обстежених площ, іржею уражено 5 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 11 % обстежених площ, фомопсисом уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 3 % на 14 % обстежених площ, сухою гниллю уражено 1 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 1 % обстежених площ,

білою гниллю уражено 2 % рослин (прикоренева форма – 47 %, стеблова форма - 15 %, кошик – 38 %) з розвитком хвороби 1 % на 30 % обстежених площ, сірою гниллю уражено 3 % рослин (прикоренева форма - 35 %, кошик - 60 %) з розвитком хвороби 1 % на 17 % обстежених площ (2289 га).

Фітофторозом уражено 20 % рослин томатів з розвитком хвороби 18 % (присадібні ділянки).

На присадібних ділянках у пізній капусті капустяною попелицею в середній чисельності 10 екз. на заселену рослину пошкоджено 60 % рослин, гусеницями капустяної совки в середній чисельності 1,1 екз. на заселену рослину пошкоджено 4 % рослин, хрестоцвітими блішками в середній чисельності 4 екз. на заселену рослину пошкоджено 80 % рослин.

В плодових садах яблуневою плодожеркою гусеницями пошкоджено 5 % плодів в середньому на 40 % дерев на 100 % площ. Паршею уражено 9 % листків з розвитком хвороби 7 % та 5 % плодів з розвитком хвороби 3 % на 30 % дерев на 100 % обстеженої площі, плодовою гниллю в середньому уражено 20 % плодів падалиці під 80 % дерев на 100 % обстеженої площі (4 га).