

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає інформаційне повідомлення щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області станом з 14 до 20 серпня 2026 року.

Кукурудза – молочна, молочно-воскова стиглість. Соя – формування бобів. Соняшник – цвітіння, формування кошиків. Сад – ріст та налив плодів. Виноград – ріст та дозрівання ягід.

Протягом звітної періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

В посівах кукурудзи злаковими блішками за середньої чисельності 8 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 5 % рослин на 2 % обстежених площ, гусеницями бавовникової совки в середній чисельності 0,7 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 86 % обстежених площ, гусеницями стеблового (кукурудзяного) метелика в середній чисельності 1,2 екз. на заселену рослину в середньому заселено та пошкоджено 4 % рослин на 5 % обстежених площ, польовими клопами в середній чисельності 4 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 5 % обстежених площ. Пухирчастою сажкою в середньому уражено 1 % рослин (на качанах – 39, на волоті – 15, на стеблах – 46 %) на 40 % обстежених площ, летючою сажкою в середньому уражено 1 % рослин (на качанах – 39, на волоті – 83 %) на 40 % обстежених площ, гельмінтоспориозом уражено 8 % рослин з розвитком хвороби 4 % на 5 % обстеженої площі (1016 га).

В посівах сої гусеницями совки-гамма в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 100 % обстежених площ, попелицями в середній чисельності 4 екз. на заселену рослину в середньому заселено та пошкоджено 1 % рослин на 54 % обстежених площ. Аскохітозом уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 3 % на 54 % обстеженої площі (80 га).

В посівах соняшнику геліхризовою попелицею за середньої чисельності 8 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 5 % рослин на 32 % обстежених площ, гусеницями бавовникової совки в середній чисельності 1,1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 19 % обстежених площ, гусеницями соняшникової вогнівки в середній чисельності 1 екз. на кошик в середньому заселено і пошкоджено 1,5 % рослин на 10 % обстежених площ, польовими клопами в середній чисельності 6 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 4 % рослин на 4 % обстежених площ. Пероноспорозом уражено 3 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 4 % обстеженої площі, септоріозом уражено 6 % рослин з розвитком хвороби 4 % на 4 % обстеженої площі, фомозом уражено 5 % рослин з розвитком хвороби 3 % на 69 % обстеженої площі, іржею уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 57 % обстеженої площі, фомопсисом уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 12 % обстеженої площі, білою гниллю уражено 2 % рослин (прикоренева форма – 37 %, стеблова форма – 18 %, кошикова форма – 45 %) з розвитком хвороби на кошиках 1 % на 15 % обстежених площ, сірою гниллю уражено 1 % рослин (прикоренева форма – 45 %, кошикова форма – 55 %) з розвитком хвороби на

кошиках 1 % на 10 % обстежених площ (2552 га).

Фітофторозом уражено 15 % рослин томатів з розвитком хвороби 10 %, верхівковою гниллю уражено 3 % плодів на 3 % рослин з розвитком хвороби 3 % (присадибні ділянки).

На присадибних ділянках у середній капусті капустяною попелицею в середній чисельності 4 екз. на заселену рослину заселено і пошкоджено 5 % рослин, гусеницями капустяної молі в середній чисельності 2 екз. на заселену рослину заселено і пошкоджено 4 % рослин, капустяною білокрилкою в середній чисельності 2 екз. на заселену рослину заселено і пошкоджено 4 % рослин (присадибні ділянки).

На присадибних ділянках у пізній капусті капустяною попелицею в середній чисельності 11 екз. на заселену рослину заселено і пошкоджено 50 % рослин, гусеницями капустяної совки в середній чисельності 1,1 екз. на заселену рослину заселено і пошкоджено 4 % рослин, хрестоцвітими блішками в середній чисельності 3 екз. на заселену рослину заселено і пошкоджено 70 % рослин (присадибні ділянки).

В плодovих садах яблуневою плодожеркою в середньому пошкоджено 7 % плодів падалиці в середньому під 38 % дерев. Паршею уражено 5 % листків з розвитком хвороби 3 % та 2 % плодів з розвитком хвороби 1% на 20 % дерев (присадибні ділянки).

У насадженнях винограду мільдью уражено 8 % листків з розвитком хвороби 2 % на 4 % кущів (присадибні ділянки).