

Клінічний випадок 4.

До лікаря звернулася мати з Майєю 5 років, маса тіла – 20 кг. Температура тіла під пахвою під час огляду 38,5°C, підвищена протягом 2 днів. Дівчинка скаржиться на біль у горлі. Кашлю та нежиті немає. П'є та ковтає воду вільно. Блювоти не було, судом не було і немає під час огляду. Опитування виявило відсутність кашлю та утрудненого дихання, болю у вусі та виділень з вуха. При фізикальному обстеженні лікар не виявив висипки на шкірі та слизових, не відзначив втягнення грудної клітки, астмоїдного дихання або стридорозного дихання, долоні не бліді. ЧДД – 19 за хвилину. Симптом ригідності потиличних м'язів негативний. Під час огляду ротоглотки виявлено наліт на мигдаликах та болючість передньошийних лімфовузлів. Дитина щеплена за віком.

Класифікуйте стан дитини. Призначте лікування.

Клінічний випадок 5.

До лікаря звернулася мати з Анею 18 міс, маса тіла – 11 кг. Температура тіла під пахвою під час огляду 38,6°C, підвищена протягом 2 днів. Дівчинка неспокійна, тримається за ліве вухо. Кашлю та нежиті немає. П'є погано, апетит знижений. Блювоти не було, судом не було і немає під час огляду. Опитування виявило відсутність кашлю та утрудненого дихання, виділень з вуха немає. При фізикальному обстеженні лікар не виявив висипки на шкірі та слизових, не відзначив втягнення грудної клітки, астмоїдного дихання або стридорозного дихання, долоні не бліді. ЧДД – 28 за хвилину. Симптом ригідності потиличних м'язів негативний. Відзначається болісна припухлість за лівим вухом. Під час огляду ротоглотки нальоту не виявлено. Дитина щеплена за віком.

Класифікуйте стан дитини. Призначте лікування.