BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG
KHOA DƯỢC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2023

THÔNG TIN THUỐC

V/v: Hướng dẫn sử dụng **Ampicillin + Sulbactam**

I. Phổ kháng khuẩn:

Ampicillin + Sulbactam aicd là một phối hợp có tác dụng diệt khuẩn. Sự phối hợp này mở rộng phổ kháng khuẩn của amoxicillin chống lại nhiều vi khuẩn tạo ra beta-lactamase trước đây kháng lại ampicillin đơn độc. Phổ kháng khuẩn bao gồm vi khuẩn gram dương ưa khí, gram âm ưa khí và vi khuẩn kị khí. Ampicilin/sulbactam không có phổ trên vi khuẩn không điển hình *Chlamydia* và *Mycoplasma.*

II. Liều dùng:

- Người lớn:
    - Uống: 375-750 mg mỗi 12 giờ
    - Tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch: 1.5-3 g mỗi 6 giờ
- Trẻ sơ sinh: tham khảo cụ thể liều dùng trong Hướng dẫn điều trị bệnh viện Hùng Vương

III. Cách dùng:

- Tiêm bắp: 1.5 g pha trong 3.2 ml NCPT hoặc Lidocain HCl 0.5% hoặc 2%
- Tiêm tĩnh mạch: Hoà tan 1.5 g trong 3.2 ml NCPT, tiêm tĩnh mạch trong 10-15 phút
- Truyền tĩnh mạch: Hoàn nguyên 1.5g trong 3.2ml NCPT, sau đó pha loãng trong 50-100ml NaCl 0.9%, truyền tĩnh mạch trong 15-30 phút

IV. Phụ nữ mang thai và cho con bú:

- Phụ nữ mang thai: Dữ liệu trên người gợi ý nguy cơ thấp
- Phụ nữ cho con bú: Tương thích

V. Lưu ý:

Ampicilin tương kỵ với các aminoglycosid, nên không được trộn chung trong cùng một bơm tiêm hoặc bình chứa.

VI. Tên một số sản phẩm sử dụng tại Bệnh viện Hùng Vương:

- Sulcilat 750mg
- Unasyn 375mg
- Senitram 0.5g + 1g
- Unasyn 0,5g + 1g

Tài liệu tham khảo:

1) *Dược thư Quốc gia Việt Nam 2022*
2) *Drugs in Pregnancy and Lactation*
3) *Thông tin tờ HDSD*

Tổ TTT-Dược lâm sàng **Khoa Dược**

Ds. Nguyễn Thanh Hoài Phong **Ds. Đoàn Thị Ngọc Hân**