



AUTOR(ES): VICTÓRIA EMANUELE SOARES RIBEIRO, ARTEMÍSIA XAVIER BARBOSA, MARIA FERNANDA SILVEIRA SCARCELLA e CARLA SILVANA DE OLIVEIRA E SILVA.

AVALIAÇÃO INDIRETA DA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE EM TRATAMENTO ENDOVENOSO AMBULATORIAL PARA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR EM MONTES CLAROS-MG

RESUMO: A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) caracteriza-se como uma doença infecto parasitária causada pelo protozoário do gênero *Leishmania*, com transmissão vetorial. A LTA pode causar deformidades físicas e psicológicas no paciente, com reflexo no campo social, laboral e econômico do indivíduo. Acerca do tratamento, o fármaco de primeira escolha recomendado pelo Ministério da Saúde é o antimonial de N-metil-glucamina (Glucantime), que deve ser aplicado durante 20 dias consecutivos. É considerado um fármaco eficaz, porém possui alta toxicidade e pode causar impactos negativos para o paciente, complicações durante a terapêutica e a suspensão do tratamento. Do total de pacientes em tratamento em 2019 no país, a taxa de abandono foi de 1,9%, o que reflete ainda a necessidade de medidas que garantam melhor manejo da patologia pela saúde pública. O objetivo desta pesquisa é realizar a avaliação indireta da assistência ambulatorial aos pacientes com LTA assistidos na cidade de Montes Claros-MG. Trata-se de um estudo quantitativo, retrospectivo realizado no ambulatório de feridas, referência para tratamento endovenoso da LTA, do município de Montes Claros- MG, durante o período de julho a agosto de 2022. Para a realização do estudo, foram estabelecidas 3 etapas, sendo inicialmente realizado uma busca bibliográfica para conhecimento teórico e aprofundamento no tema, seguido de coleta e análise dos dados dos prontuários de todos os pacientes atendidos no período de julho de 2017 até abril de 2022. As variáveis coletadas referem-se ao tratamento, abandono de terapêutica e motivo. A amostra final do estudo foi de 77 pacientes e a partir da análise identificou-se uma taxa de abandono no município de 16,8% e dentre os motivos estão: não comparecimento (2); relato de epigastrologia (1) e alterações de exames, como o Eletrocardiograma e Hemograma (10). Portanto, concluímos que a principal causa de abandono na cidade de Montes Claros decorre de alterações cardíacas e laboratoriais corroborando com o descrito na literatura que relata o potencial cardio e hepatotóxico do Glucantime, como causa de interrupção da terapêutica. Além disso, observamos uma taxa de abandono no município cerca de 16 vezes maior que a taxa do país, o que demonstra um dado preocupante no que se refere ao manejo terapêutico da LTA na cidade.

PALAVRAS-CHAVE: Terapêutica. Leishmaniose. Antiparasitário. Cardiotoxicidade.

Apoio financeiro: CNPq

Aprovação Comitê de Ética: CEP/UNIMONTES 4.332.499/2020