Шкала надання паліативної допомоги PPS (Palliative Performance Scale)

Пацієнт: _____Дата проведення оцінки:_____ Оцінку проводив:_____

Рівень PPS	Здатність самостійно пересуватися	Діяльність та ознаки хвороби	Самообслуговування	Прийом їжі	Рівень свідомості
100%	Повна	Нормальна повсякденна та професійна діяльність. Ознаки хвороби відсутні	Цілковите	Нормальний	Повна
90%	Повна	Нормальна повсякденна та професійна діяльність. З'являються ознаки хвороби	Цілковите	Нормальний	Повна
80%	Повна	Звична діяльність викликає труднощі. Проявляються деякі ознаки хвороби	Цілковите	Нормальний або знижений	Повна
70%	Обмежена	Професійна діяльність /робота неможлива. Значні ознаки хвороби	Цілковите	Нормальний або знижений	Повна
60%	Обмежена	Не спроможний займатися улюбленими /побутовими справами. Значні ознаки хвороби	Іноді потребує сторонньої допомоги	Нормальний або знижений	Повна або спутана
50%	Переважно сидить/лежить	Не спроможний виконувати будь-яку роботу. Тяжкі ознаки хвороби	Значною мірою потребує сторонньої допомоги	Нормальний або знижений	Повна або спутана
40%	Переважну кількість часу проводить у ліжку	Не спроможний на будь-яку діяльність . Тяжкі ознаки хвороби	Залежить від сторонньої допомоги	Нормальний або знижений	Повна або апатична +/- спутана
30 %	Цілковито прикутий до ліжка	Не спроможний на будь-яку діяльність. Тяжкі ознаки хвороби	Не може обходитися без сторонньої допомоги	Нормальний або знижений	Повна або апатична +/- спутана
20%	Цілковито прикутий до ліжка	Не спроможний на будь-яку діяльність.Тяжкі ознаки хвороби.	Не може обходитися без сторонньої допомоги	Зменшений до маленьких ковтків	Повна або апатична +/- спутана
10%	Цілковито прикутий до ліжка	Не спроможний на будь-яку діяльність. Тяжкі ознаки хвороби	Не може обходитися без сторонньої допомоги	Тільки годування	Апатична або коматозна +/- спутана
0%	Смерть	-	-	-	-

УВАГА! Пацієнт потребує паліативної допомоги , якщо значення PPS ≤ 30%

Шкала надання паліативної допомоги PPS (Palliative Performance Scale)

Пацієнт: _____Дата проведення оцінки:_____ Оцінку проводив:_____

Рівень PPS	Здатність самостійно пересуватися	Діяльність та ознаки хвороби	Самообслуговування	Прийом їжі	Рівень свідомості
100%	Повна	Нормальна повсякденна та професійна діяльність. Ознаки хвороби відсутні	Цілковите	Нормальний	Повна
90%	Повна	Нормальна повсякденна та професійна діяльність. З'являються ознаки хвороби	Цілковите	Нормальний	Повна
80%	Повна	Звична діяльність викликає труднощі. Проявляються деякі ознаки хвороби	Цілковите	Нормальний або знижений	Повна
70%	Обмежена	Професійна діяльність /робота неможлива. Значні ознаки хвороби	Цілковите	Нормальний або знижений	Повна
60%	Обмежена	Не спроможний займатися улюбленими /побутовими справами. Значні ознаки хвороби	Іноді потребує сторонньої допомоги	Нормальний або знижений	Повна або спутана
50%	Переважно сидить/лежить	Не спроможний виконувати будь-яку роботу. Тяжкі ознаки хвороби	Значною мірою потребує сторонньої допомоги	Нормальний або знижений	Повна або спутана
40%	Переважну кількість часу проводить у ліжку	Не спроможний на будь-яку діяльність . Тяжкі ознаки хвороби	Залежить від сторонньої допомоги	Нормальний або знижений	Повна або апатична +/- спутана
30 %	Цілковито прикутий до ліжка	Не спроможний на будь-яку діяльність. Тяжкі ознаки хвороби	Не може обходитися без сторонньої допомоги	Нормальний або знижений	Повна або апатична +/- спутана
20%	Цілковито прикутий до ліжка	Не спроможний на будь-яку діяльність.Тяжкі ознаки хвороби.	Не може обходитися без сторонньої допомоги	Зменшений до маленьких ковтків	Повна або апатична +/- спутана
10%	Цілковито прикутий до ліжка	Не спроможний на будь-яку діяльність. Тяжкі ознаки хвороби	Не може обходитися без сторонньої допомоги	Тільки годування	Апатична або коматозна +/- спутана
0%	Смерть	-	-	-	-

УВАГА! Пацієнт потребує паліативної допомоги , якщо значення PPS ≤ 30%

Шкала надання паліативної допомоги PPS (Palliative Performance Scale)

Пацієнт: _____Дата проведення оцінки:_____ Оцінку проводив:_____

Рівень PPS	Здатність самостійно пересуватися	Діяльність та ознаки хвороби	Самообслуговування	Прийом їжі	Рівень свідомості
100%	Повна	Нормальна повсякденна та професійна діяльність. Ознаки хвороби відсутні	Цілковите	Нормальний	Повна
90%	Повна	Нормальна повсякденна та професійна діяльність. З'являються ознаки хвороби	Цілковите	Нормальний	Повна
80%	Повна	Звична діяльність викликає труднощі. Проявляються деякі ознаки хвороби	Цілковите	Нормальний або знижений	Повна
70%	Обмежена	Професійна діяльність /робота неможлива. Значні ознаки хвороби	Цілковите	Нормальний або знижений	Повна
60%	Обмежена	Не спроможний займатися улюбленими /побутовими справами. Значні ознаки хвороби	Іноді потребує сторонньої допомоги	Нормальний або знижений	Повна або спутана
50%	Переважно сидить/лежить	Не спроможний виконувати будь-яку роботу. Тяжкі ознаки хвороби	Значною мірою потребує сторонньої допомоги	Нормальний або знижений	Повна або спутана
40%	Переважну кількість часу проводить у ліжку	Не спроможний на будь-яку діяльність . Тяжкі ознаки хвороби	Залежить від сторонньої допомоги	Нормальний або знижений	Повна або апатична +/- спутана
30 %	Цілковито прикутий до ліжка	Не спроможний на будь-яку діяльність. Тяжкі ознаки хвороби	Не може обходитися без сторонньої допомоги	Нормальний або знижений	Повна або апатична +/- спутана
20%	Цілковито прикутий до ліжка	Не спроможний на будь-яку діяльність.Тяжкі ознаки хвороби.	Не може обходитися без сторонньої допомоги	Зменшений до маленьких ковтків	Повна або апатична +/- спутана

10%	Цілковито прикутий до ліжка	Не спроможний на будь-яку діяльність. Тяжкі ознаки хвороби	Не може обходитися без сторонньої допомоги	Тільки годування	Апатична або коматозна +/- спутана
0%	Смерть	-	-	-	-

УВАГА! Пацієнт потребує паліативної допомоги , якщо значення PPS ≤ 30%