

ТЕМА : М'ясні та комбіновані породи великої рогатої худоби.

План

1. М'ясні породи худоби.
2. Породи комбінованої продуктивності.

1. До вітчизняних м'ясних порід належать українська м'ясна і волинська м'ясна. Найбільш поширеними породами зарубіжної селекції в Україні є: герефордська, абердин-ангуська, шароле, кіанська, санта-гертруда.

Українська м'ясна порода створена складним відтворним схрещуванням симентальської, шароле, сірої української та кіанської порід із наступним розведенням помісей „у собі”.

Основними екстер'єрними особливостями породи є крупніють, глибока й широка грудна клітка, добре розвинена задня частина тулуба, міцний кістяк, обмускуленість. Масть світло-полова, полова. Жива маса корів – 600-710, бугаїв – 1000-1270кг. Міжотельний період триває 400 днів у 6-и місячному віці молодняк досягає живої маси 200-220кг. У бугайців статева зрілість настає в 11-14 місяців. Розводять худобу української м'ясної породи в різних кліматичних зонах України.

Волинська м'ясна порода виведена складним відтворним схрещуванням корів чорно-рябої й частково червоної польської з плідниками абердин-ангуської, герефордської та лімузинської порід. Тулуб у них видовжений, кістяк міцний, голова не велика, шия коротка, добра обмускуленість, особливо задньої частини. Жива маса корів – 500-550, бугаїв – 950-1050кг. Телята народжуються живою масою 28 – 32кг. В 15-18-и місячному віці бугайці при середньодобових приростах 1000-1200г досягають живої маси 470-590кг із витратою кормів на 1кг приросту 6,2-8 к.од. Забійний вихід – 60-66%. Породу розводять у західних регіонах України.

2. Основними породами комбінованого напряму продуктивності є симентальська, лебединська, бура карпатська, сіра українська, пінцгау.

Симентальська порода виведена в Швейцарії. Відзначається міцною конституцією, високим зростом, міцним кістяком, добре розвиненими м'язами. Масть полова, полого-ряба і червоно-ряба.

Жива маса корів – 550-650, бугаїв – 900-1000кг. Телята народжуються живою масою 35-46кг. Надій у племінних господарствах 3500-4000кг. Вміст жиру в молоці – 3,7-3,9%.

Симентальська худоба відрізняється добрими м'ясними якостями. Середньодобові прирости молодняку при відгодівлі досягають 800-1000г. Забійний вихід становить 54-58%. Порода районована в лісостеповій зоні України. Симентальську худобу використано для виведення української м'ясної.

Племінна робота з породою спрямована на підвищення молочності, поліпшення будови тіла і збереження вмісту жиру в молоці.

Лебединська порода створена схрещуванням сірої української худоби з бугаями швіцької породи й подальшим розведенням помісей „у собі”. Тварини цієї породи мають міцну конституцію, пропорційну будову тіла, добре розвинене вим’я. Продуктивність корів – 3300-4000кг молока з вмістом жиру 3,8-3,9%. Середньодобові прирости становлять 900-1000г. Забійний вихід – 54-56%.

З метою збереження цінного генофонду лебединської породи планується чистопородне розведення.

Бура карпатська порода виведена відтворним схрещуванням місцевої худоби з різними відріддями бурих порід альпійського походження. Жива маса корів – 450-500, бугаїв – 700-800кг. Надій – 3000-3500кг, вміст жиру в молоці – 3,7-3,8%. Забійний вихід 45-52%. Розводять її у Закарпатській області.

Сіра українська порода у ХІХ столітті вважалась найбільш поширеною в Україні. На її основі створено червону степову, лебединську, буру карпатську, а також була використана для виведення української м’ясної породи.

Порода пінцгау виведена в Австрії в альпійській долині Пінцгау. Худоба помірно скороспіла, добре пристосована до гірських умов. Масть червона, вздовж спини проходить біла смуга, нижня частина грудей, живіт і гомілки білі. Розводять її і Чернівецькій та Івано–Франківській областях.

Питання для самоконтролю:

1. Які найбільш розповсюдженні породи великої рогатої худоби комбінованого напрямку?
2. Охарактеризуйте симентальську породу худоби.
3. Характеристика м’ясних порід.
4. Охарактеризуйте буру карпатську худобу.