

ІНСТРУКТИВНІ КАРТКИ № 39.

ТЕМА: Ознайомлення з методикою лікування гінекологічних захворювань.

МЕТА: засвоїти методику лікування гінекологічних захворювань.

ОБЛАДНАННЯ: станок, тварини, стерилізатори, кружка Есмарха, піхвові дзеркала, вата, марля, шприци, дезінфікуючі розчини.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ:

ЗАВДАННЯ 1. Провести гінекологічне обстеження ректальним і вагінальним способом.

ЗАВДАННЯ 2. Провести лікування вестебуліту вагініту. Запалення передвер'я піхви (вестибуліт) та піхви (вагініт). Частіше хвороба трапляється у жуйних тварин. Проводять загальне клінічне дослідження тварин. Доглядають передвер'я піхви і піхву, де можуть бути різні форми запалення.

Серозне запалення характеризується запальним набряком і гіперемією слизової оболонки передвер'я піхви і піхви. На ній з'являються крапкові і смугасті крововиливи. Сеча виділяється малими порціями. Ексудат засихає на корені хвоста у вигляді кірочок.

Катаральне запалення виявляється великим виділенням жовтуватого-білого ексудату. Слизова оболонка передвер'я піхви набрякла, гіперемійована і вкрита ексудатом. У корів зменшується добовий надій, вона пригнічена, після дефекації й сечовипускання тварина стогне. При гнійному запаленні слизова оболонка статевих органів місцями ущільнена, болюча, з наявністю ерозій.

Флегмано́зне запалення супроводжується потовщенням слизової оболонки. Колір слизової оболонки червоно-синій. Місцями з'являються абсцеси, і крововиливи.

Лікування спочатку підготовляють зовнішні статеві органи. Піхву зрошують теплим розчином вуглекислої соди, і 2-3%- розчином натрію хлориду для розрідження ексудату. Порожнину піхви систематично обробляють дезінфікуючими

розчинами: фурациліну, 1-2% розчину протарголу. Уражену слизову оболонку змазують біоміциновою, пеніциліновою мазями, 1-10% синтоміциновою або 5-10%- стрептоцидовою емульсіями. Іноді у піхву вкладають тампон просочений 10% іхтіоловою або 20% ксероформною мазями. Ерозії на слизовій оболонці піхви обробляють обліпиховою олією, з цією метою застосовують 10% розчин протарголу, ляпису або палички ляпису.

ЗАВДАННЯ 3. Провести лікування скритого ендометриту. Ввести в матку 50-70 мл., лініменту стрептоциду, або синтоміцину . Іхтіолотерапія - внутрім'язево ввести по 20 мл., 7% розчину іхтіолу з інтервалом 2 дні.

СТУДЕНТ ПОВИНЕН ЗНАТИ: Особливості лікування гінекологічних захворювань.

СТУДЕНТ ПОВИНЕН ВМІТИ: Досліджувати апарат розмноження, проводити лікування гінекологічних захворювань.

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ: І. І. Карташов – практикум «Ветеринарне акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с/г тварин.»