

Етапи	Послідовність дій	Обґрунтування
Початковий етап	<p>Підготовка до процедури</p> <p>Психологічно підготуйте пацієнта, зберіть алергологічний анамнез.</p> <p>.Здійснити гігієнічну обробку рук, надіти маску і рукавички</p>	<p>Дотримується право пацієнта на інформацію.</p> <p>Дотримується інфекційна безпека</p>
Основний етап	<p>Виконання процедури:</p> <p>Внутрішню поверхню передпліччя однієї руки протріть двома стерильними тампонами, зволоженими 70 % етиловим спиртом. Висушіть сухим стерильним тампоном.</p> <p>Із заповненого розчином другого розведення антибіотика шприца через голку нанесіть кілька крапель розчину на шкіру і за допомогою стерильної голки або скарифікатора зробіть паралельно 2 подряпини — скарифікації так, щоб не виділилась кров.</p> <div data-bbox="531 893 975 1223" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="539 1267 978 1518" data-label="Image"> </div>	<p>Забезпечується послідовність виконання процедури</p>
Завершальний етап	<p>3. Закінчення процедури</p> <p>Продезінфікуйте використане оснащення.</p> <p>Вимийте і висушіть руки.</p> <p>Якщо через 20 хв на місці скарифікації буде почервоніння, припухлість або свербіж шкіри — реакція позитивна. Якщо змін на шкірі, крім подряпин, немає – то реакція негативна.</p> <p>Повідомте лікаря і зробіть позначку у відповідному медичному документі.</p>	<p>Забезпечується документування процедури.</p> <p>Дотримується інфекційна безпека</p>