

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає оперативну інформацію щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області за період 08-14 квітня 2022 року.

Озима пшениця, озимий ячмінь – кущення. Озимий ріпак – початок відростання розетки.

Протягом звітної періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

В посівах озимої пшениці гусеницями озимої совки за середньої чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 23 % обстежених площ, личинками хлібної жужелиці (туруна) в середній чисельності 0,3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 21 % обстеженої площі, злаковими блішками за середньої чисельності 1,6 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 15 % обстежених площ. В теплі сонячні дні у посівах озимої пшениці спостерігається літ злакових мух: шведські мухи – в середньому 8 екз. на 100 п.с., гессенська муха – 6 екз. та пшенична муха – 3 екз. на 100 п.с на 8 % від обстежених площ, злаковими цикадами в середній чисельності 7 екз. на 100 п.с. заселено 45 % обстежених площ. Борошнистою россою уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 17 % обстежених площ, бурюю іржею уражено 3 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 22 % обстежених площ, септоріозом уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 56 % обстежених площ (1440 га).

В посівах озимого ячменю гусеницями озимої совки за середньої чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 0,1 % рослин на 22 % обстежених площ, личинками хлібної жужелиці (туруна) в середній чисельності 0,2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 22 % обстеженої площі. Гельмінтоспоріозом уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 40 % обстежених площ (349 га).

В посівах озимого ріпаку гусеницями озимої совки за середньої чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 0,1 % рослин на 32 % обстежених площ, хрестоцвітими блішками за середньої чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 52 % обстежених площ, капустяним стебловим прихованохоботником за середньої чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 5 % обстежених площ. Альтернاریозом уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 30 % обстежених площ, пероноспорозом уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 22 % обстежених площ (509 га).

На площах озимої пшениці середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 2, нір на колонію – 3 на 37 % обстеженої площі 1440 га. На площах озимого ячменю середня чисельність колоній шкідника – 2, нір на колонію – 3 на 34 % обстеженої площі 349 га. На площах озимого ріпаку середня чисельність колоній шкідника – 1,4, нір на колонію – 4 на 53 % обстеженої площі 509 га. На неорних площах середня чисельність колоній шкідника – 1, нір на колонію 7 на 100 % обстеженої площі 4 га. На площах багаторічних трав

середня чисельність колоній шкідника – 1, нір на колонію 3 на 100 % обстеженої площі 60 га.