

На виконання розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації від 28 лютого 2025 року № 454-р «Про проведення в області комплексу весняно-польових робіт у 2025 році» управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає оперативну інформацію щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області за період з 02 по 08 травня 2025 року.

Озима пшениця – початок виходу в трубку. Озимий ячмінь – утворення нижнього вузла соломини Ячмінь –кущення. Озимий ріпак – цвітіння. Горох – гілкування. Кукурудза –сходи. Сад- цвітіння.

Протягом звітнього періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

В посівах озимої пшениці злаковими блішками за середньої чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 4 % рослин на 42 % обстежених площ, хлібними клопами за середньої чисельності 0,4 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 29% обстежених площ, злаковими попелицями в середній чисельності 3 екз. на заселену рослину в середньому заселено та пошкоджено 3 % рослин на 30 % обстеженої площі, злаковими п'явицями за середньої чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 22 % обстежених площ. В теплі сонячні дні у посівах озимої пшениці спостерігається літ злакових мух: гессенська муха – 14 екз на 100 п.с. на 14 % від обстежених площ, пшенична муха - 17 екз на 100 п.с. на 14 % від обстежених площ, шведські мухи – 4 екз. на 100 п.с на 44 % від обстежених площ, злаковими цикадами в середній чисельності 1 екз. на 100 п.с. на 25 % обстежених площ. Борошнистою россою уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 22 % обстежених площ, бурю іржею уражено 3 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 30 % обстежених площ, септоріозом уражено 3 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 53 % обстежених площ (1377 га).

В посівах ячменю злаковими блішками за середньої чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 100 % обстежених площ, злаковими п'явицями в середній чисельності 0,5 екз. на заселену рослину в середньому пошкоджено 2 % рослин на 100 % обстеженої площі (57 га).

В посівах озимого ячменю борошнистою россою уражено 3 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 71 % обстежених площ, гельмінтоспоріозом уражено 2% рослин з розвитком хвороби 1 % на 71 % обстежених площ (102 га).

В посівах озимого ріпаку хрестоцвітими блішками за середньої чисельності 4 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 14 % рослин на 21 % обстежених площ, капустяним стебловим прихованохоботником за середньої чисельності 0,6 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 21 % обстежених площ з 05 травня відмічено початок яйцекладки шкідника, оленкою волохатою в середній чисельності 1,4 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 4 % квіток на 70 % обстежених площ, ріпаківим квіткоїдом в

середній чисельності 1,2 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 6 % квіток на 24% обстежених площ, ріпаковим насіннєвим прихованохоботником в середній чисельності 1,4 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 3 % квіток на 60 % обстежених площ. Альтернаріозом уражено 7 % рослин з розвитком хвороби 6 % на 37 % обстежених площ (397 га).

В посівах гороху піщаним мідляком за середньої чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 41 % обстежених площ (596 га).

В посівах кукурудзи піщаним мідляком за середньої чисельності 1,7 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 100 % обстежених площ (138 га).

Колорадським жуком в середній чисельності 1 екз. на кущ заселено і пошкоджено 3 % кущів картоплі (присадибні ділянки).