

Mô tả ngắn sản phẩm:

- + Arcoxia là thuốc thuộc nhóm kháng viêm, giảm đau không Steroid do công ty Frosst Iberica S.A chịu trách nhiệm sản xuất & phân phối, có xuất xứ thương hiệu tại Tây Ban Nha. Được sử dụng trong các trường hợp: thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, viêm cột sống dính khớp và viêm khớp gút cấp tính.
- + Thành phần chính: Etoricoxib
- + Dạng bào chế: viên nén bao phim
- + Chỉ định: Viêm cột sống dính khớp, Viêm khớp dạng thấp, Đau bụng kinh, Gút
- + Thuốc kê đơn: Có (thuốc chỉ dùng theo đơn của bác sĩ)
- + SĐK: VN-20809-17
- + Sản xuất tại: Tây Ban Nha
- + Thương hiệu: Frosst Iberica S.A
- + Độ tuổi: 18+
- + Lưu ý: Mọi thông tin trên website chỉ có tính chất tham khảo. Hãy liên hệ Dược sĩ để được tư vấn chi tiết.

Mô tả chi tiết sản phẩm:

1. Thuốc Arcoxia là thuốc gì?

Arcoxia là thuốc thuộc nhóm kháng viêm, giảm đau không Steroid do công ty Frosst Iberica S.A chịu trách nhiệm sản xuất & phân phối, có xuất xứ thương hiệu tại Tây Ban Nha. Được sử dụng trong các trường hợp: thoái hóa khớp, viêm đa khớp dạng thấp, viêm cột sống dính khớp và viêm khớp gút cấp tính.

2. Thành phần thuốc Arcoxia

Mỗi viên thuốc Arcoxia 60mg chứa:

- Etoricoxib..... 60mg.
- Tá dược: Calci hydro phosphat (dạng khan), Croscarmellose natri, Magnesi. stearaL Microcrystalline Cellulose (Cellulose vi tinh thể), Lactose monohydrate (Lactose ngậm một phân tử nước), sáp Carnauba, Hypromellose, Titan dioxyd, Indigo Carmine Lake (màu chàm - đỏ son và tía), Iron Oxide Yellow (oxit sắt vàng), Triacetin.

3. Dạng bào chế

Thuốc Arcoxia được bào chế dưới dạng viên nén bao phim 60mg.

4. Công dụng

Thuốc Arcoxia là một loại thuốc chống viêm, giảm các cơn đau và đặc biệt không chứa steroid, có tác dụng ức chế chọn lọc COX-2 mạnh mẽ, sử dụng thường xuyên sẽ giúp cải thiện các triệu chứng của bệnh viêm xương khớp, thoái hóa khớp hay đau cơ mãn tính.

5. Cách dùng

+ Đối tượng sử dụng: người trên 18 tuổi

+ Liều dùng, thời điểm dùng:

- Viêm xương khớp:

Người lớn nên dùng 30mg hoặc 60mg mỗi ngày một lần

- Viêm khớp dạng thấp và viêm đốt sống dính khớp

Người lớn nên dùng 90mg x 1 lần / ngày.

- Viêm khớp do gút cấp tính

Người lớn nên dùng 120 mg x 1 lần / ngày. Thuốc Arcoxia 120mg chỉ nên dùng tối đa 8 ngày trong thời điểm có triệu chứng bệnh cấp tính .

- Đau cấp tính và đau bụng kinh nguyên phát

Người lớn nên dùng 120 mg x 1 lần / ngày. Thuốc Arcoxia 120mg chỉ nên dùng tối đa 8 ngày trong thời điểm có triệu chứng bệnh cấp tính.

- Đau sau phẫu thuật nha khoa

Liều khuyên dùng là 90mg x 1 lần / ngày trong tối đa 3 ngày và có thể có những bệnh nhân yêu cầu thêm thuốc giảm đau bổ sung.

**** Lưu ý: Sản phẩm này có thể được dùng bằng đường uống, cùng với thức ăn hoặc không.*

6. Chỉ định

Arcoxia được kê đơn đối với những bệnh nhân gặp những bệnh lý như:

- Có những biểu hiện của viêm xương khớp cấp và mãn tính, cũng như viêm đa khớp dạng thấp.
- Bệnh nhân viêm cột sống gốc chi
- Người bị viêm khớp gút cấp tính
- Bệnh nhân có các cơn đau cấp tính và mãn tính, cụ thể là chứng đau bụng kinh cơ (đau bụng kinh nguyên phát).
- Người bệnh gặp các cơn đau ngắn hạn, vừa liên quan đến phẫu thuật răng.

7. Chống chỉ định

Thuốc Arcoxia không được khuyến cáo cho những bệnh nhân:

- Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Có dấu hiệu hen phế quản, mày đay hoặc phản ứng nhạy cảm với aspirin hoặc các thuốc kháng viêm không steroid khác trước đó.

- Suy tim với phù nề sung huyết
- Người bệnh tăng huyết áp, không kiểm soát được huyết áp và luôn cao hơn 140/90 mmHg.
- Bệnh động mạch vành, bệnh động mạch ngoại biên hoặc tai biến mạch máu não.
- Bệnh gan triệu chứng nặng
- Loét dạ dày hoặc chảy máu đường tiêu hóa hoạt động.
- Bài tiết creatinin
- Thuốc Arcoxia không nên được sử dụng cùng với các thuốc chống viêm không steroid khác do thiếu bằng chứng về lợi ích và khả năng xảy ra các tác dụng phụ bất lợi khác có thể gặp.

8. Tác dụng phụ

Bệnh nhân có thể gặp những tác dụng phụ không mong muốn sau đây:

- Tiểu cầu bị giảm. Phản ứng phản vệ/giả phản vệ như: sốc, tăng kali máu, lo lắng, rối loạn giấc ngủ, lú lẫn, ảo giác, trầm cảm và bồn chồn.
- Buồn ngủ, rối loạn vị giác và mờ mắt
- Đánh trống ngực/hồi hộp, cơn đau thắt ngực, nhịp tim nhanh và cơn tăng huyết áp kịch phát... đều là các triệu chứng của suy tim sung huyết.
- Viêm phế quản dạng hen
- Đau bụng, lở loét vùng miệng, loét đường tiêu hóa (bao gồm cả thủng và xuất huyết); nôn mửa và tiêu chảy là tất cả các triệu chứng cũng có thể xảy ra.
- Viêm gan, vàng da và tăng nồng độ AST/ALT
- Mề đay phù mạch, ngứa, ban đỏ, phát ban, hoại tử thượng bì nhiễm độc và nổi mề đay.

9. Thận trọng

Thận trọng khi sử dụng thuốc Arcoxia cho:

- Bệnh nhân có tiền sử bệnh tim mạch nên sử dụng thuốc Arcoxia một cách thận trọng (tăng huyết áp, tăng lipid máu, tiểu đường, hút thuốc lá, sử dụng đồng thời axit acetylsalicylic).
- Bệnh nhân mất nước nghiêm trọng (cần bù nước trước khi tiêm Arcoxia) .
- Bệnh nhân có tiền sử thủng, loét và chảy máu tiêu hóa.
- Những bệnh nhân từng lên cơn hen suyễn cấp tính trước đây, thường bị mày đay và viêm mũi do sử dụng salicylic hoặc chất ức chế cyclooxygenase không chọn lọc.
- Bệnh nhân đang điều trị các bệnh nhiễm khuẩn...
- Phụ nữ đang cho con bú phải ngưng sử dụng thuốc Arcoxia hoặc ngưng cho con bú khi đang dùng thuốc.
- Những người trên 65 tuổi.

10. Bảo quản

- Không bảo quản thuốc trong môi trường ẩm ướt - nơi vi khuẩn có thể sinh sôi.
- Để nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc ánh sáng cường độ cao, nên đựng trong bao bì kín .
- Thuốc nên được bảo quản ở nhiệt độ dưới 30 ° C.

11. Mua thuốc Arcoxia ở đâu?

<Thuốc kê đơn > Thuốc Arcoxia được bán theo đơn, chỉ mua khi có đơn của bác sĩ. Bạn có thể gửi đơn thuốc tại website này để các dược sĩ của nhà thuốc Thanh Xuân tư vấn chi tiết.

12. Giá bán

Thuốc Arcoxia được bán với giá giao động từ 420.000 - 450.000/hộp 60mg (Hộp 3 vỉ x 10 viên). Gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn mua đúng thuốc, đúng giá, đúng bệnh.

**Lưu ý: Dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ và tư vấn của dược sĩ.*