BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG
KHOA DƯỢC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2023

THÔNG TIN THUỐC

V/v: Hướng dẫn sử dụng **Ciprofloxacin**

I. Phổ kháng khuẩn:

- Vi khuẩn gram âm, hiếu khí: *Enterobacteriaceae (Proteus mirabilis, E. coli, Klebsiella), Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenza, Legionella spp.*
- Vi khuẩn gram dương, hiếu khí: *Streptococci (S. penumoniae* kém nhạy cảm*)*

II. Liều dùng:

- Liều uống thường dùng: 250 – 750 mg mỗi 12 giờ
- Liều uống dạng phóng thích chậm:
    - Chỉ dùng điều trị nhiễm khuẩn đường tiết niệu ở người lớn
    - Viêm bàng quang cấp, không biến chứng: 500 mg mỗi 24 giờ x 3 ngày
    - Nhiễm trùng tiểu có biến chứng, viêm bể thận: 1 g mỗi 24 giờ x 7 – 14 ngày
- Truyền tĩnh mạch: 200 – 400 mg mỗi 8 – 12 giờ

III. Cách dùng:

- Đường uống: không uống cùng với sữa, sữa chua, các sản phẩm có chứa calci vì làm giảm hấp thu đáng kể thuốc
- Đường tiêm:
    - Dung dịch đậm đặc ciprofloxacin lactat để tiêm chứa 10 mg/ml phải pha loãng với dung môi (nước cất pha tiêm, natri clorid 0,9% hoặc dextrose 5%) tạo thành dung dịch chứa 1 – 2 mg/ml
    - Dung dịch ciprofloxacin lactat để tiêm truyền tĩnh mạch chứa 2 mg/ml không cần pha loãng

IV. Phụ nữ mang thai và cho con bú:

- ***Phụ nữ mang thai***: có liên quan đến thoái hóa sụn ở động vật còn non trong nghiên cứu. Vì vậy, chống chỉ định sử dụng ở phụ nữ mang thai (chỉ dùng khi nhiễm khuẩn nặng mà không có thuốc khác thay thế)
- ***Phụ nữ cho con bú***: không dùng ciprofloxacin ở người cho con bú, nếu buộc phải dùng thì ngưng cho con bú

V. Lưu ý: theo dõi phản ứng có hại viêm gân, đặt gân gót chân (đặc biệt ở bệnh nhân dùng đồng thời corticosteroid, người cấy ghép tạng, trên 60 tuổi)

VI. Tên một số sản phẩm sử dụng tại Bệnh viện Hùng Vương:

Ciprofloxacin Kabi 200mg/100ml

Tài liệu tham khảo

1) *Dược thư Việt Nam 2022*
2) *Drugs in Pregnancy and Lactation 2017*
3) *Sanford Guide 2023*

Tổ TTT-Dược lâm sàng	**Khoa Dược**
Ds. Trương Văn Hoà	**Ds. Đoàn Thị Ngọc Hân**