

Adherencia a la vacunación de patógenos respiratorios en el primer año de diagnóstico de VIH en un Hospital general de agudos de CABA

Vacunas y Otros Virus

Garibaldi, Franco Hugo. Hospital Argerich. Grana, Guadalupe. Hospital Argerich. Irassar, Ana Clara. Hospital Argerich. Garcia Linares, Josefina. Hospital Argerich. Alvares, Lara. Hospital Argerich. Cabral, Joaquin. Hospital Argerich. Cordova, Ezequiel. Hospital Argerich. Cecchini, Diego. Hospital Argerich. Caba

Introducción. La adherencia a la vacunación constituye una problemática creciente. Las PLVIH presentan mayor morbilidad asociada a infecciones por patógenos respiratorios, particularmente al inicio de la infección y en casos de diagnóstico tardío. En este estudio analizamos la adherencia a la vacunación durante el primer año de diagnóstico. **Materiales y métodos.** Estudio observacional retrospectivo, incluye pacientes con nuevo diagnóstico de VIH entre 1/1/2023- 1/1/2025 en un hospital general de agudos de Buenos Aires. Se analizaron variables demográficas, estatus inmunológico, adherencia a los controles médicos, así como la indicación y aplicación de vacunas respiratorias durante el primer año posterior al diagnóstico. Se consideraron los esquemas nacionales vigentes al momento de la indicación. **Resultados.** Se incluyeron 156 pacientes. Edad: 33 años (RIC 27–43); 70,5% (n=110) fueron hombres cisgénero. El 43% (n=68) presentó diagnóstico tardío de VIH. La vacuna antigripal fue indicada al 86% (n=136); el 92% (n=125) la recibió y el 70% (n=125) se la aplicó en la semana de la indicación. La vacuna antineumocócica fue indicada al 94% (n=147). El 90% (n=132) recibió al menos una dosis, y el 70% (n=93) completó el esquema (53% esquema secuencial; 47% VCN 20), con aplicación en la semana de la indicación en el 67% (n=88). La vacuna contra SARS-CoV-2 se indicó al 69% (n=108); el 80% (n=86) recibió una dosis y el 20% (n=17) recibió las dos dosis. El 72% (n=62) se vacunó en la semana de la indicación. La adherencia global fue del 45,5% y el 50% la recibió la misma semana de la indicación. Se observó asociación entre adherencia al TARV (49.6% vs 29%; p=0.039) y a controles médicos (52.6% vs 27%; p=0.004) con la aplicación de las 3 vacunas. **Conclusiones.** Se observó una mayor indicación médica de las vacunas antigripal y antineumocócica en comparación con la vacuna contra SARS-CoV-2, la indicación y adherencia a los refuerzos cada 6 meses resultaron bajas. La mayoría de los pacientes recibió las vacunas la misma semana de la indicación. La adherencia al tratamiento antirretroviral y a los controles médicos se asoció significativamente con la aplicación de las tres vacunas