

Варіант 3

Тести

Лікарські препарати, які застосовують при тяжких хворобах: шок, колапс, отруєння (снодійними, нейролептиками, транквілізаторами, харчовими продуктами, наркотиками)

|   |             |   |               |
|---|-------------|---|---------------|
| 1 | Sombrevinum | 5 | Benzohexonium |
| 2 | Barbamilum  | 6 | Dermatolum    |
| 3 | Hygronium   | 7 | Mesatonum     |
| 4 | Bemegridum  | 8 | Isadrinum     |

Чим відрізняється стероїдні протизапальні засоби від нестероїдних?

|   |              |   |                 |
|---|--------------|---|-----------------|
| 1 | Дія          | 5 | Метод лікування |
| 2 | Активність   | 6 | Проводимість    |
| 3 | Застосування | 7 | Пасивність      |
| 4 | Ефект        | 8 |                 |

Лікарський препарат, який блокує дію норадреналіну

|   |                           |   |                 |
|---|---------------------------|---|-----------------|
| 1 | Tropaphenum               | 5 | Dimedrolum      |
| 2 | Mesatonum                 | 6 | Bemegridum      |
| 3 | Ephedrinum hydrochloridum | 7 | Cordiaminum     |
| 4 | Proserinum                | 8 | Paracetamololum |

Яка побочна дія у препаратів лазикс та гіпотиазид?

|   |                  |   |  |
|---|------------------|---|--|
| 1 | Калійзберігаючим | 5 |  |
| 2 | Калійвиводящим   | 6 |  |
| 3 |                  | 7 |  |
| 4 |                  | 8 |  |

Оберіть препарати, які відносяться до місцевих анестетиків

|   |             |   |             |
|---|-------------|---|-------------|
| 1 | Anaprilinum | 5 | Novocainum  |
| 2 | Bemegridum  | 6 | Isadrinum   |
| 3 | Cordiaminum | 7 | Euphyllinum |
| 4 | Analginum   | 8 | Coffeinum   |

Який з препаратів застосовується при лікуванні виразкової хвороби шлунку?

|   |                   |   |                |
|---|-------------------|---|----------------|
| 1 | Phencarolum       | 5 | Aminophyllinum |
| 2 | Musatonum         | 6 | Diprozinum     |
| 3 | Tropaphenum       | 7 | Benzohexonium  |
| 4 | Oxyferriscarbonum | 8 | Prazozinum     |

Яка побічна дія у серцевих глікозидів?

|   |                              |   |                        |
|---|------------------------------|---|------------------------|
| 1 | Частішає серцевий ритм       | 5 | Зменшують А/Т          |
| 2 | Викликають кумуляцію         | 6 | Збільшують А/Т         |
| 3 | Уповільнення серцевого ритму | 7 | Покращують автоматизм  |
| 4 | Мають противорвотну дію      | 8 | Мають снотворний ефект |

Які препарати необхідно назначити для лікування легкої форми цукрового діабету?

Варіант 3

Тести

|   |                     |   |                   |
|---|---------------------|---|-------------------|
| 1 | <u>Dithylinum</u>   | 5 | <u>Lazix</u>      |
| 2 | <u>Amidopyrinum</u> | 6 | <u>Biseptol</u>   |
| 3 | <u>Bemegridum</u>   | 7 | <u>Bicillinum</u> |
| 4 | <u>Adebit</u>       | 8 | <u>Bucarban</u>   |

Лікарський препарат, який застосовують при набряках для лікування хронічної серцево-судинної недостатності

|   |                          |   |                    |
|---|--------------------------|---|--------------------|
| 1 | <u>Sulfocamphocainum</u> | 5 | <u>Lazix</u>       |
| 2 | <u>Benzohexonium</u>     | 6 | <u>Anaprilinum</u> |
| 3 | <u>Nitroglycerinum</u>   | 7 | <u>Proserinum</u>  |
| 4 | <u>Mucalthinum</u>       | 8 | <u>Analginum</u>   |

Засіб, який має анальгезуючу, жарознижуючу та протизапальну дію

|   |                    |   |                      |
|---|--------------------|---|----------------------|
| 1 | <u>Papaverinum</u> | 5 | <u>NO-SPA</u>        |
| 2 | <u>Novocainum</u>  | 6 | <u>Phthorothanum</u> |
| 3 | <u>Analginum</u>   | 7 | <u>Suprastinum</u>   |
| 4 | <u>Mucalthinum</u> | 8 | <u>Biseptol</u>      |

$\beta$  - адреноблокатор, який ослаблює та сповільнює серцевий ритм

|   |                                |   |                      |
|---|--------------------------------|---|----------------------|
| 1 | <u>Omnoponum</u>               | 5 | <u>Phentolaminum</u> |
| 2 | <u>Novocainum</u>              | 6 |                      |
| 3 | <u>Mucilago Amyli</u>          | 7 | <u>Anaprilinum</u>   |
| 4 | <u>Lobelini hydrochloridum</u> | 8 | <u>Raunatinum</u>    |

Яку побічну дію викликають місцеві анестетики?

|   |                                       |   |                                     |
|---|---------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | <u>Викликають рвоту</u>               | 5 | <u>Викликають алергічну реакцію</u> |
| 2 | <u>Головокружіння</u>                 | 6 | <u>Порушення слухового апарату</u>  |
| 3 | <u>Дисбактеріоз</u>                   | 7 | <u>Викликають сонливість</u>        |
| 4 | <u>Роздратування печінки та нирок</u> | 8 | <u>Викликають звикання</u>          |

Оберіть препарати, які посилюють згортання крові?

|   |                    |   |                                 |
|---|--------------------|---|---------------------------------|
| 1 | <u>Aceclidinum</u> | 5 | <u>Thrombinum</u>               |
| 2 | <u>Vikasolum</u>   | 6 | <u>Ephedrini hydrochloridum</u> |
| 3 | <u>Proserinum</u>  | 7 | <u>Digitoxinum</u>              |
| 4 | <u>Celanidum</u>   | 8 | <u>Dicynon</u>                  |

Які препарати відносяться до групи "сульфаніламіли"?

|   |                       |   |                     |
|---|-----------------------|---|---------------------|
| 1 | <u>Resorcinum</u>     | 5 | <u>Icthyolum</u>    |
| 2 | <u>Chlorominum</u>    | 6 | <u>Naphthalinum</u> |
| 3 | <u>Antiforminum</u>   | 7 | <u>Furacilinum</u>  |
| 4 | <u>Sulfodimezinum</u> | 8 | <u>Sulfazinum</u>   |

Які препарати відносяться до водорозчинних вітамінів?

|   |                         |   |                            |
|---|-------------------------|---|----------------------------|
| 1 | <u>Thiaini bromidum</u> | 5 | <u>Acidum ascorbinicum</u> |
| 2 | <u>Bromhexin</u>        | 6 | <u>Almagel</u>             |

Варіант 3

Тести

|   |                     |   |                           |
|---|---------------------|---|---------------------------|
| 3 | <u>Nitrazepamum</u> | 7 | <u>Acidum nicotinicum</u> |
| 4 | <u>Proserinum</u>   | 8 | <u>Dimedrolum</u>         |

Який з препаратів необхідно вводити у ліжку хворого, щоб не було ортостатичного колапсу?

|   |                      |   |                      |
|---|----------------------|---|----------------------|
| 1 | <u>Octadinum</u>     | 5 | <u>Analginum</u>     |
| 2 | <u>Aminazinum</u>    | 6 | <u>Verapamilum</u>   |
| 3 | <u>Promedolum</u>    | 7 | <u>Butadionum</u>    |
| 4 | <u>Benzohexonium</u> | 8 | <u>Paracetamolum</u> |

Які препарати відносяться до стероїдних протизапальних засобів?

|   |                        |   |                      |
|---|------------------------|---|----------------------|
| 1 | <u>Prednisolonum</u>   | 5 | <u>Analginum</u>     |
| 2 | <u>Anaprilinum</u>     | 6 | <u>Verapamilum</u>   |
| 3 | <u>Hydrocortisonum</u> | 7 | <u>Butadionum</u>    |
| 4 | <u>Pirilenum</u>       | 8 | <u>Paracetamolum</u> |

Назвіть побічну дію антибіотиків пеніцилінового ряду

|   |                                     |   |                                          |
|---|-------------------------------------|---|------------------------------------------|
| 1 | <u>Подразнення шлунку</u>           | 5 | <u>Порушення слухового апарату</u>       |
| 2 | <u>Малотоксичні</u>                 | 6 | <u>Викликають зміни печінки та нирок</u> |
| 3 | <u>Викликають рвоту</u>             | 7 | <u>Дисбактеріоз</u>                      |
| 4 | <u>Викликають алергічні реакції</u> | 8 | <u>Лейкопенія</u>                        |

Який препарат має протиаритмічну та коронаророзширюючу дію?

|   |                                  |   |                        |
|---|----------------------------------|---|------------------------|
| 1 | <u>Sulfocamphocainum</u>         | 5 | <u>Strophanthinum</u>  |
| 2 | <u>Ephedrinum hydrochloridum</u> | 6 | <u>Nitroglycerinum</u> |
| 3 | <u>Anaprilinum</u>               | 7 | <u>Butadionum</u>      |
| 4 | <u>Verapamilum</u>               | 8 | <u>Glucosum</u>        |

Лікарський препарат, при яких відбувається покращення провідності, збільшення автоматизма серця, АТ

|   |                      |   |                      |
|---|----------------------|---|----------------------|
| 1 | <u>Analginum</u>     | 5 | <u>Isadrinum</u>     |
| 2 | <u>Oxacilinum</u>    | 6 | <u>Cordiaminum</u>   |
| 3 | <u>Synthomycinum</u> | 7 | <u>Aminazinum</u>    |
| 4 | <u>Proserinum</u>    | 8 | <u>Benzohexonium</u> |

Лікарські препарати, які збуджують життєвоважливі центри: дихальний, судинно-руховий

|   |                        |   |                                 |
|---|------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | <u>Mesatonum</u>       | 5 | <u>Coffeinum natrii benzoat</u> |
| 2 | <u>Corazolum</u>       | 6 | <u>Cordiaminum</u>              |
| 3 | <u>Promedolum</u>      | 7 | <u>Bemegridum</u>               |
| 4 | <u>Atropini sulfas</u> | 8 | <u>Trophaphenum</u>             |

До якої групи препаратів відноситься *левоміцин*?

|   |                             |   |                          |
|---|-----------------------------|---|--------------------------|
| 1 | <u>М-холіноміметикам</u>    | 5 | <u>Нейролептики</u>      |
| 2 | <u>Місцевим анестетикам</u> | 6 | <u>Н-холіноблокаторы</u> |
| 3 | <u>Аналептики</u>           | 7 |                          |
| 4 | <u>Антибіотики</u>          | 8 |                          |

Варіант 3

Тести

Лікарський засіб, який відноситься до коронаролітикам та жовчогінним препаратам

|   |                          |   |               |
|---|--------------------------|---|---------------|
| 1 | Acidum acetylsalicylicum | 5 | Progesteronum |
| 2 | Micracidum               | 6 | Rutinum       |
| 3 | Hygronium                | 7 | NO-SPA        |
| 4 | Dythylinum               | 8 | Rauwasonum    |

Анальгетик, який викликає ейфорію

|   |                         |   |                   |
|---|-------------------------|---|-------------------|
| 1 | Cythytonum              | 5 | Amidopyrinum      |
| 2 | Morphini hydrochloridum | 6 | Sulfocamphocainum |
| 3 | Hystaminum              | 7 | Euphyllinum       |
| 4 | Analginum               | 8 | Dicainum          |

Засіб для інгаляційного наркозу

|   |                     |   |             |
|---|---------------------|---|-------------|
| 1 | Acidum ascorbinicum | 5 | Mesatonum   |
| 2 | Octadinum           | 6 | Dermatolum  |
| 3 | Reserpinum          | 7 | Omnoponum   |
| 4 | Phthorothanum       | 8 | Tropaphenum |

Назвіть препарат, який надає непряму дію на згортання крові (гнепрямий антикоагулянт)

|   |                            |   |                |
|---|----------------------------|---|----------------|
| 1 | Vitaminum K                | 5 | Neodicumarinum |
| 2 | Pilocarpini hydrochloridum | 6 | Octadinum      |
| 3 | Lidocainum                 | 7 | Reserpinum     |
| 4 | Novocainum                 | 8 | Bemegridum     |

Лікарський препарат, який необхідно ввести в/в в екстримальній ситуації

|   |                         |   |            |
|---|-------------------------|---|------------|
| 1 | Morphini hydrochloridum | 5 | Corvalolum |
| 2 | Phthorothanum           | 6 | Metazidum  |
| 3 | Bemegridum              | 7 | Analginum  |
| 4 | Benzohexonium           | 8 |            |

Який препарат та які його дії використовують при гостром панкреатиті?

|   |              |   |                                          |
|---|--------------|---|------------------------------------------|
| 1 | Isadrinum    | 5 | Звужує периферичні судини                |
| 2 | Contrykol    | 6 | Гіпотензивна дія                         |
| 3 | Naphthyzinum | 7 | Розслаблення гладкої мускулатури бронхів |
| 4 | Octadinum    | 8 | Зменшення секреції підшлункової залози   |

Препарат з групи вітамінів при недостатності цього препарату, порушення зору та відбувається ослаблення темної адаптації

|   |            |   |                 |
|---|------------|---|-----------------|
| 1 | Baralginum | 5 | Retinoli acetos |
| 2 | Camphoral  | 6 | Reopyrinum      |
| 3 | Analginum  | 7 | Novodrinum      |
| 4 | Bemegridum | 8 | Mucalthinum     |

Обрати правильну відповідь, визначити фармакологічну групу та виписати рецепт

### Варіант 3

#### Тести

У результаті застосування сульфаніламідних препаратів, вони можуть викликати

|   |                       |   |                        |
|---|-----------------------|---|------------------------|
| 1 | <u>Нудоту</u>         | 5 | <u>Слабкість</u>       |
| 2 | <u>Озноб</u>          | 6 | <u>Утруднення мови</u> |
| 3 | <u>Головокружіння</u> | 7 | <u>Лейкопенія</u>      |
| 4 | <u>Пітливість</u>     | 8 | <u>Зменшений АТ</u>    |