

**Практический навык (манипуляция):**  
**наложение кровоостанавливающего жгута-закрутки**

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 0 частичное выполнение – 1
1.	Проконтролировал отсутствие опасности для себя и пострадавшего: – продемонстрировал жест «Осмотр безопасности среды»; – проговорил: <i>«Безопасно»</i>	1	
2.	Принял меры безопасности: – проговорил: <i>«По возможности обработать руки антисептиком»</i> ; – надел маску; – надел перчатки	1	
3.	Наладил контакт с пострадавшим: – представился. Проговорил: <i>«Меня зовут ...»</i> ; – проинформировал о намерении помочь. Проговорил <i>«Я Вам окажу помощь, наложу кровоостанавливающий жгут-закрутку»</i> ; – получил согласие на ее выполнение. Проговорил: <i>«Вы согласны?»</i> ; – предложил занять необходимое положение. Проговорил: <i>«Присядьте, пожалуйста»</i> , помог сесть пострадавшему	1	
4.	Придал поврежденной конечности возвышенное положение: – левую руку пострадавшего приподнял и уложил на свое надплечье	2	
5.	Применил пальцевое прижатие артерии на протяжении:	2	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 0 частичное выполнение – 1
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– расположил второй, третий, четвертый пальцы в верхней трети левого плеча в месте определения пульсации плечевой артерии и осуществил прижатие артерии;</li> <li>– попросил помощника или самого пострадавшего повторить данное действие;</li> <li>– проконтролировал правильное его выполнение (сделал замечание в случае неточного выполнения действия)</li> </ul>		
6.	<p>Выбрал и подготовил место наложения жгута-закрутки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– проговорил: <i>«При артериальном кровотечении из верхней трети левого предплечья жгут-закрутка накладывается на нижнюю треть левого плеча. При кровотечении из ран предплечья и плеча жгут-закрутка накладывается на плечо (кроме его средней трети), при кровотечении из ран голени и бедра - на бедро (кроме его нижней трети), выше места повреждения»;</i></li> <li>– обернул полностью циркулярно нижнюю треть левого плеча полотенцем или салфеткой, исключая образование складок и неровностей</li> </ul>	1	
7.	<p>Подготовил и правильно расположил жгут-закрутку:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– взял первую тесемку жгута-закрутки двумя руками по середине на расстоянии около 25 см, подвел под левую руку пострадавшего, обернул вокруг руки слегка ниже середины салфетки и завязал на 1 узел с латеральной стороны;</li> <li>– взял вторую тесемку жгута-закрутки двумя руками по</li> </ul>	1	



№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 0 частичное выполнение – 1
	середине на расстоянии около 25 см, подвел под левую руку пострадавшего, обернул вокруг руки на 5 см выше первой тесемки и завязал на 1 узел с латеральной стороны;		
8.	Наложил жгут-закрутку: – взял в руки палочку (карандаш), положил на узел первой тесемки и закрепил его вторым узлом; – прокрутил палочку (карандаш) 5-10 оборотов; – закрепил палочку (карандаш), расположил ее на узле второй тесемки и зафиксировал дополнительным узлом; – попросил помощника или самого пострадавшего отпустить пальцевое прижатие артерии; – опустил конечность пострадавшего вниз	2	
9.	Проверил правильность наложения жгута: – проговорил: <i>«Кровотечение остановлено»</i> ; – второй, третий (и четвертый) пальцы руки расположил на области лучевой артерии левой руки пострадавшего; – проговорил: <i>«Пульс не определяется»</i> – проговорил: <i>«Конечность побледнела»</i>	2	
10.	Использовал записку: – на небольшом листе бумаги записал время наложения жгута, указал свою фамилию и инициалы как лица, наложившего жгут; – поместил записку под последний тур жгута	2	
11.	Провел обезболивание:	1	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 0 частичное выполнение – 1
	– проговорил: <i>«По возможности обезболить»</i>		
12.	Наложил асептическую повязку на рану в верхней трети левого предплечья: – проговорил: <i>«По возможности обработать кожу вокруг раны антисептиком»</i> ; – наложил асептическую (чистую) салфетку; – наложил циркулярную (6 – 8 туров) бинтовую повязку на область раны в верхней трети левого предплечья	1	
13.	Провел иммобилизацию поврежденной конечности наложением косыночной повязки на левую руку пострадавшего: – придал поврежденной конечности среднефизиологическое положение (угол сгибания в локте чуть меньше 90, предплечье расположено параллельно полу); – подвел косынку под предплечье таким образом, чтобы основание ее было параллельно средней линии тела, а вершина направлена в сторону локтевого сустава поврежденной конечности; – приподнял верхний конец косынки вверх на надплечье поврежденной стороны и перекинул с надплечья поврежденной стороны по задней поверхности шеи на надплечье здоровой стороны; – поднял нижний конец косынки, огибая поврежденное предплечье, к надплечью здоровой стороны; – связал концы косынки на здоровой стороне; – зафиксировал вершину косынки так, чтобы жгут-закрутка осталась видна; – проконтролировал, что только кончики пальцев остались видны для наблюдения за конечностью;	1	



№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 2 невыполнение – 0 частичное выполнение – 1
	– проговорил: <i>«В холодное время год укутать поврежденную конечность»</i>		
14.	<p>Обеспечил транспортировку пострадавшего в положении лежа в организацию здравоохранения:</p> <p>– проговорил: <i>«Вызвать бригаду скорой медицинской помощи по номерам «101» или «103» или «112»»;</i></p> <p>– проговорил: <i>«Сообщить информацию о месте нахождения пострадавшего, пол, примерный возраст, состояние пострадавшего, объем оказанной помощи пострадавшему»;</i></p> <p>– проговорил: <i>«Необходимо обеспечить транспортировку пострадавшего в организацию здравоохранения в положении лежа»;</i></p> <p>– проговорил: <i>«Жгут-закрутку накладывать максимально на 1 час. Детям до 3-х лет жгут не накладывать. При длительной транспортировке каждые 20-30 минут ослаблять жгут-закрутку на 10-15 минут, используя пальцевое прижатие для остановки кровотечения (повторное наложение жгута-закрутки необходимо производить выше предыдущего места и указать в записке время послабления)»</i></p>	1	
	<b>ВСЕГО</b>		