

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає інформаційне повідомлення щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області станом з 10 по 16 жовтня 2025 року.

Кукурудза, соняшник – повна стиглість, збирання. Озимий ріпак – сходи, 2 листочки. Озима пшениця – сходи.

Протягом звітнього періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

У посівах озимої пшениці гусеницями озимої совки за середньої чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 100 % обстежених площ, гусеницями капустяного білану за середньої чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 4 % рослин на 7 % обстежених площ, личинками хлібної жужелиці за середньої чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 16 % обстежених площ. Відмічається літ злакових мух: гессенської мухи – 2 екз. на 100 п.с., шведських мух – 2 екз. на 100 п.с., пшеничної мухи – 1 екз. на 100 п.с., цикадок в середньому нараховується 3 екз. на 100 п.с. на 18 % обстежених площ (918 га).

У посівах озимого ріпаку хрестоцвітими блішками в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 18 % обстеженої площі, гусеницями капустяної молі за середньої чисельності 1 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 2 % рослин на 7 % обстежених площ, гусеницями озимої совки за середньої чисельності 0,4 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 30 % обстежених площ, гусеницями капустяного білану за середньої чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 4 % рослин на 7 % обстежених площ, білокрилкою за середньої чисельності 3 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 5 % рослин на 14 % обстежених площ, капустяною попелицею за середньої чисельності 5 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 5 % рослин на 7 % обстежених площ, несправжніми гусеницями ріпакового пильщика в середній чисельності 1 екз. на рослину в середньому пошкоджено 5 % рослин на 21 % обстежених площ. Альтернативіозом уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 6 % обстежених площ, білою плямистістю уражено 1 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 7 % обстежених площ (1097 га).

В посівах соняшнику білою гниллю уражено 8 % рослин (прикоренева форма – 35 %, стеблова – 25 %, кошикова – 40 %) з розвитком хвороби 3 % на 17 % обстежених площ, сірою гниллю уражено 12 % рослин (прикоренева форма – 30 %, стеблова – 30 %, кошикова – 40 %) з розвитком хвороби 6 % на 43 % обстежених площ (127 га).

На площах озимого ріпаку середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 1, нір на колонію – 2 на 14 % обстеженої площі 1097 га. На площах з-під соняшнику середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 1, нір на колонію – 5 на 100 % обстеженої площі 36 га. На площах багаторічних трав середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 2, нір на колонію – 3 на

100 % обстеженої площі 100 га. На неорних площах середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 2, нір на колонію – 3 на 96 % обстеженої площі 28 га. На площах з-під кукурудзи (62 га) мишоподібних гризунів не виявлено.

Комірні шкідники. При обстеженні 0,02 тис. тонн пшениці, 0,02 тис. тонн кукурудзи та 0,03 тис. тонн соняшнику шкідників не виявлено.