

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає оперативну інформацію щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області за період з 25 по 31 жовтня 2024 року.

Озима пшениця – сівба, сходи. Озимий ріпак – сходи, утворення листкової розетки.

Протягом звітної періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

У посівах озимої пшениці личинками хлібної жужелиці в середній чисельності 0,4 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 0,8 % рослин на 20 % обстеженої площі, гусеницями озимої совки в середній чисельності – 0,4 екз. на кв.м пошкоджено 1 % рослин на 24 % обстеженої площі, яйцекладками злакової попелиці в середній чисельності 2 екз. на рослину в середньому заселено 1 % рослин на 11 % обстежених площ. Відмічається літ злакових мух: гессенської мухи – 1 екз. на 100 п.с., шведських мух – 2 екз. на 100 п.с., пшеничної мухи – 1 екз. на 100 п.с., цикадок в середньому нараховується 1,5 екз. на 100 п.с. на 13-18 % обстежених площ (1650 га).

У посівах озимого ріпаку гусеницями озимої совки за середньої чисельності 0,3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 21 % обстежених площ, несправжніми гусеницями ріпакового пильщика в середній чисельності 1 екз. на рослину в середньому пошкоджено 3 % рослин на 20 % обстежених площ. Альтернативіозом уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 31 % обстежених площ (492 га).

На площах озимої пшениці середня чисельність колоній мишоподібних гризунів 1, нір на колонію 3 на 33 % обстеженої площі 1650 га. На площах озимого ріпаку середня чисельність колоній мишоподібних гризунів 1, нір на колонію 2 на 33 % обстеженої площі 492 га. На площах з-під соняшнику середня чисельність колоній мишоподібних гризунів 2, нір на колонію 6 на 100 % обстеженої площі 114 га, на площах з-під зернових середня чисельність колоній мишоподібних гризунів 1, нір на колонію 3 на 100 % обстеженої площі 150 га, на площах багаторічних трав середня чисельність колоній мишоподібних гризунів 1, нір на колонію 4 на 100 % обстеженої площі 50 га, на неорних площах середня чисельність колоній мишоподібних гризунів 2, нір на колонію 4 на 100 % обстеженої площі 7 га, на площах озимого ячменю (83 га) та з-під кукурудзи (102 га) мишоподібних гризунів не виявлено.