

На виконання розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації від 28 лютого 2025 року № 454-р «Про проведення в області комплексу весняно-польових робіт у 2025 році» управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає оперативну інформацію щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області за період з 30 травня по 05 червня 2025 року.

Озима пшениця – колосіння. Ячмінь – колосіння. Озимий ріпак – поява стручків. Горох – початок цвітіння, цвітіння. Кукурудза, соняшник – сходи, листоутворення. Картопля - стеблування, початок цвітіння. Сад – утворення плодів.

Протягом звітної періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

В посівах озимої пшениці хлібними клопами в середній чисельності 0,4 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 34 % обстежених площ, середня чисельність яйцекладок шкідника 0,5 екз. на кв.м на 25 % обстежених площ, середня чисельність личинок 0,5 екз. на кв.м на 17 % обстежених площ; злаковими трипсами в середній чисельності 3 екз. на колос заселено 5 % рослин на 34 % обстежених площ, личинками злакових трипсів в середній чисельності 2 екз. на колос заселено 2 % рослин на 17 % обстежених площ; злаковими блішками за середньої чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 17 % обстежених площ; імаго злакових п'явиць за середньої чисельності 1,1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 22 % обстежених площ, личинками шкідника за середньої чисельності 1 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 2 % рослин на 33 % обстежених площ; злаковими попелицями в середній чисельності 8 екз. на заселену рослину в середньому заселено та пошкоджено 5 % рослин на 43 % обстеженої площі. Борошнистою росю уражено 5 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 35 % обстежених площ, бурю іржею уражено 5 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 29 % обстежених площ, септоріозом уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 34 % обстежених площ (2906 га).

В посівах ярого ячменю злаковими блішками за середньої чисельності 8 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 5 % рослин на 80 % обстеженої площі, злаковими попелицями в середній чисельності 4 екз. на заселену рослину в середньому заселено та пошкоджено 5 % рослин на 20 % обстеженої площі, личинками злакових п'явиць за середньої чисельності 4 екз. на рослину в середньому пошкоджено 5 % рослин на 20 % обстежених площ. Гельмінтоспоріозом уражено 5 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 20 % обстеженої площі (201 га).

В посівах кукурудзи злаковими блішками за середньої чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 44 % обстежених площ, злаковими попелицями в середній чисельності 4 екз. на заселену рослину в

середньому заселено та пошкоджено 6 % рослин на 55 % обстеженої площі (715 га).

В посівах гороху середня чисельність горохової попелиці за 16 екз. на 100 п.с. на 66 % обстежених площ, середня чисельність горохового зерноїда за 3 екз. на 100 п.с. на 40 % обстежених площ, бульбочковими довгоносіками за середньої чисельності 3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 6 % рослин на 41 % обстежених площ. Пероноспорозом уражено 5 % рослин з розвитком хвороби 3 % на 28 % обстеженої площі (429 га).

В посівах соняшнику дротяниками в середній чисельності 0,2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 9 % обстежених площ, піщаним мідляком в середній чисельності 0,8 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 17 % обстежених площ, сірим довгоносіком в середній чисельності 0,2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 8 % обстежених площ, личинками коника зеленого в середній чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 5 % рослин на 3 % обстежених площ. Пероноспорозом уражено 5 % рослин з розвитком хвороби 3 % на 2 % обстеженої площі (3369 га).

В посівах озимого ріпаку капустяним стручковим комариком в середній чисельності 3 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 8 % стручків на 4 % рослин на 12 % обстежених площ, хрестоцвітими клопами в середній чисельності 0,3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 0,5 % рослин на 72 % обстежених площ (254 га).

На присадибних ділянках у ранній капусті капустяною попелицею в середній чисельності 6 екз. на заселену рослину пошкоджено 7 % рослин, хрестоцвітими блішками в середній чисельності 2 екз. на заселену рослину пошкоджено 7 % рослин, капустяною білокрилкою в середній чисельності 3 екз. на заселену рослину пошкоджено 3 % рослин.

Колорадським жуком в середній чисельності 1,2 екз. на кущ заселено і пошкоджено 4 % кущів картоплі, яйцекладками в середній чисельності 1 шт. на рослину в середньому заселено 4 % кущів, личинками в середній чисельності 4 шт. на рослину в середньому заселено 5 % кущів (присадибні ділянки).

В плодovих садах яблуневою попелицею в середній чисельності 4 екз. на лист пошкоджено 3 % листків в середньому на 48 % дерев. Борошнистою россою уражено 3 % листків з розвитком хвороби 2 % на 30 % дерев. Парша уражено 2 % листків з розвитком хвороби 1 % на 10 % дерев (5 га).