

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає інформаційне повідомлення щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області станом з 19 по 25 вересня 2025 року.

Кукурудза – повна стиглість. Соняшник – повна стиглість, збирання. Озимий ріпак – сходи, 2 листочки. Озима пшениця – сходи.

Протягом звітної періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

У посівах озимої пшениці личинками шведський мух в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 0,2 % рослин на 100 % обстеженої площі, гусеницями озимої совки в середній чисельності – 0,2 екз. на кв.м пошкоджено 2 % рослин на 100 % обстеженої площі. Відмічається літ цикадок в середньому нараховується 3 екз. на 100 п.с. на 100 % обстежених площ (322 га).

У посівах озимого ріпаку хрестоцвітими блішками в середній чисельності 0,3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 48 % обстеженої площі, гусеницями капустяної совки за середньої чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 37 % обстежених площ, гусеницями озимої совки за середньої чисельності 0,4 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 93 % обстежених площ, білокрилкою за середньої чисельності 1 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 1 % рослин на 37 % обстежених площ, несправжніми гусеницями ріпакового пильщика в середній чисельності 1 екз. на рослину в середньому пошкоджено 5 % рослин на 52 % обстежених площ (381 га).

В посівах кукурудзи гусеницями стеблового (кукурудзяного) метелика в середній чисельності 1 екз. на заселену рослину в середньому заселено та пошкоджено 4 % рослин на 48 % обстежених площ. Фузаріозом уражено 23 % качанів на 100 % обстежених площ (522 га).

В посівах соняшнику гусеницями бавовникової совки в середній чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 11 % рослин на 3 % обстежених площ. Фомозом уражено 7 % рослин з розвитком хвороби 5 % на 39 % обстежених площ, пероноспорозом уражено 4 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 4 % обстежених площ, іржею уражено 8 % рослин з розвитком хвороби 4 % на 5 % обстежених площ, бурою сухою гниллю уражено 12 % рослин (кошики) з розвитком хвороби 10 % на 17 % обстежених площ, білою гниллю уражено 3 % рослин (прикоренева форма – 42 %, стеблова – 9 %, кошикова – 55 %) з розвитком хвороби 1 % на 43 % обстежених площ, сірою гниллю уражено 2 % рослин (прикоренева форма – 11 %, стеблова – 7 %, кошикова – 82 %) з розвитком хвороби 2 % на 42 % обстежених площ (812 га).

Фітофторозом уражено 32 % рослин томатів з розвитком хвороби 23 % (присадибні ділянки).

На присадибних ділянках у пізній капусті капустяною попелицею в

середній чисельності 7 екз. на заселену рослину пошкоджено 10 % рослин, хрестоцвітими блішками в середній чисельності 1,2 екз. на заселену рослину пошкоджено 19 % рослин. Слизовим бактеріозом уражено 1 % рослин з розвитком хвороби 1 %.

На площах з-під зернових колосових культур середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 1, нір на колонію – 3 на 100 % обстеженої площі 146 га. На площах з-під соняшнику середня чисельність колоній мишоподібних гризунів – 1, нір на колонію – 6 на 100 % обстеженої площі 79 га. На площах з-під сої (34 га) мишоподібних гризунів не виявлено.