

Kewaunee School District-Illness Protocol



Symptom	May Be At School	Send Home	May Return
Stomach pain	If not severe, improves on own/with rest, no vomiting and no fever.	If accompanied by fever, and does not feel better after resting or eating a snack.	When symptoms improve, no fever for 24 hours.
Cough	If no distress, able to cover cough, no fever, and no symptoms/concern for pertussis or influenza.	Severe, with shortness of breath, wheezing, fever, body aches.	When symptoms improve, no fever for 24 hours.
Diarrhea	If it's from eating something that didn't agree with their stomach.	If it's with vomiting, fever, or rash.-If they are incontinent of stool X2.	No incontinent diarrhea for 24 hours.
Ear pain	Mild discomfort or improves with rest, warmth or time.	If it's lasted more than a day, accompanied by a fever, severe pain, ear red/drainage, or hearing loss.	When ear pain diminished enough for child to remain comfortable while at school.
Hand, foot & mouth disease	If no fever and no open sores.	If sores are draining, fever present, or student is unable to control hygiene or close contact with others.	Open sores must remain covered or be scabbed over, no fever.
Lice	If no live lice are present.	If live lice are found.	After lice treatment and no live lice are present. Student will be checked upon arrival back to school.
Pinkeye	No	If there is fever, change in behavior, or unable to avoid touching eyes.	Symptom improvement, no fever and 24 hours after beginning treatment.
Mononucleosis	After fever has resolved for 24 hours without fever reducing medications	If accompanied by fever.	If illness prevents participation, no contact sports until released from the provider.

Rash	If mild, small area of the body, and is not causing student to be uncomfortable or appearing contagious.	If accompanied by drainage, fever, headache, diarrhea, sore throat, vomiting, if located over a large area of the body, or is bright red and sore to the touch.	When improved or if diagnosed contagious and cleared by MD.
Ringworm	If infection is able to be covered. Notify parent treatment will be necessary. During time of active lesions on exposed areas of body, close physical contact should be limited and area should remain covered.	If sores are draining or large areas of body affected that can not be covered.	May return after starting antifungal treatment, open sores must remain covered or be scabbed over. May stay in school if lesions can be covered.
Scabies	NO	If exposed to someone with a confirmed case or if there is a rash presenting in a line fashion with sore or scabbed appearance.	Exclude until treatment is complete.
Sore throat	If throat appears slightly irritated from postnasal drainage. No fever.	If strep throat is suspected (tonsils red and swollen, may have white spots, fever, sore throat, swollen lymph nodes in the neck).	If strep: May return to school after 12 hours of antibiotic therapy initiation, feeling well and fever free for 24 hours without fever reducing medications
Temperature 100.4° or above	NO	Will be sent home with fever 100.4° or over.	Must be fever free without the aid of Tylenol or Ibuprofen for 24 hours.
Vomiting	NO	Will be sent home if vomits at school.	No vomiting in the past 24 hours.

Please note that these are only guidelines to follow. Every child is different, and the school personnel will use their professional medical judgment when deciding if a child should be at school or at home.

Updated 8/2020



Distrito escolar Kewaunee - El protocolo de enfermedades



Sintoma	Puede estar en la escuela	Manda a casa	Puedo regresar
Dolor de estómago/ la panza	Si no es grave, mejora con descanso, no está vomitando y no tiene fiebre.	Si tiene fiebre y se siente mejor después de descanso o de comer.	Cuando las síntomas mejora y no tiene fiebre por 24 horas.
Tos	Si no hay angustia, puede cubrir el tos, no tiene fiebre, y no tiene síntomas/preocupaciones de tos ferina o la gripe.	Es grave, no puede respirar bien, jadeo, fiebre, y dolor del cuerpo.	Cuando las síntomas mejora y no tiene fiebre por 24 horas.
Diarrea	Causado por algún comida en que no esté acuerdo con la panza / el estómago..	Si incluye vomitar, fiebre, o erupción en la piel.- Si uno es incontinente de heces dos veces	No incontinent diarrhea for 24 hours.
Dolor de oreja	Molestias leves o mejora con el descanso, el calor o el tiempo.	Si continua más de un día, acompañado con un fiebre, dolor grave, si es rojo o está drenando, o falta de oír.	Cuando el dolor de oído ha disminuido lo suficiente como para que el niño permanezca cómodo mientras está en la escuela.
Enfermedad de manos, pies y boca	Si no hay fiebre o lesiones abiertas.	Si hay lesiones que están drenando, hay fiebre, o el estudiante no tiene control higiénico o está en contacto muy cercano con otros	Lesiones abiertas necesita mantener cubiertos o tener una costra, no fiebre
Piojos	No hay piojos vivos presentes	Si encuentra piojos vivos.	Después del tratamiento de piojos y no hay piojos vivos presentes. El estudiante será revisado al llegar a la escuela.
La conjuntivitis aguda (Ojo rosa)	No	Si hay fiebre, cambio de comportamiento o no puede evitar tocarse los ojos.	Mejora de los síntomas, sin fiebre y 24 horas después de comenzar el tratamiento.

Mononucleosis	Después de que la fiebre haya desaparecido durante 24 horas sin medicamentos para reducir la fiebre.	Si se acompaña de fiebre.	Si la enfermedad impide la participación, no hay deportes de contacto hasta que el proveedor lo libere.
Erupción	Si es leve, área pequeña del cuerpo, y no está causando que el estudiante se sienta incómodo o parezca contagioso.	Si se acompaña de drenaje, fiebre, dolor de cabeza, diarrea, dolor de garganta, vómitos, si se encuentra en una gran área del cuerpo, o es de color rojo brillante y adolorido al tacto.	Cuando mejora o si se diagnostica contagioso y despejado por MD.
Tiña	Si la infección puede ser cubierta. Notifique que el tratamiento de los padres será necesario. Durante el tiempo de lesiones activas en áreas expuestas del cuerpo, el contacto físico cercano debe ser limitado y el área debe permanecer cubierta.	Si las úlceras están drenando o si hay grandes áreas del cuerpo afectadas que no pueden cubrirse	Puede regresar después de comenzar el tratamiento antimicótico, las llagas abiertas deben permanecer cubiertas o con costras. Puede permanecer en la escuela si se pueden cubrir las lesiones.
Sarna	NO	Si se expone a alguien con un caso confirmado o si hay una erupción cutánea que se presenta en forma de línea con apariencia adolorida o con costras.	Excluir hasta que se complete el tratamiento.
Dolor de garganta	Si parece que la garganta está un poco irritada de drenaje postnasal. No tiene fiebre	Si se sospecha amigdalitis estreptocócica (amígdalas rojas e inflamadas, pueden tener manchas blancas, fiebre, dolor de garganta, ganglios linfáticos inflamados en el cuello).	En caso de estreptococo: puede regresar a la escuela después de 24 horas de inicio de la terapia con antibióticos, sentirse bien y sin fiebre.
Temperatura de 100.4° o mas	NO	Se le enviaría a su casa si tiene una temperatura de 100.4° o mas..	Debe estar libre de fiebre sin la ayuda de Tylenol o Ibuprofeno por 12 horas.
Vómito	NO	Se le enviaría a su casa si vomita	No ha vomitado en los últimos 24 horas.

Tenga en cuenta que estas son solo pautas a seguir. Cada niño es diferente, y el personal de la escuela usará su criterio médico profesional al decidir si un niño debe estar en la escuela o en el hogar.

Updated 8/202