


التمرين الأول : قرر صاحب شبكة توزيع الانترنت دراسة تطور عدد الزبائن في المجتمع الحضري (المدينة) من سنة 1999 الى سنة 2005 ولخص النتائج في الجدول التالي:

السنوات	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
الرتبة x_i	1	2	3	4	5	6	7
عدد الزبائن y_i بالملايين	0.5	3	6	8.4	12.1	15	18

- الجزء الأول :** 1/ مثل سحابة النقط $(M_i(x_i ; y_i))$ في معلم متعامد.
تؤخذ : 1cm على محور الفواصل تمثل 1 رتبة ، 1cm على محور الترتيب تمثل 1 مليون.
2 / أحسب إحداثيي النقطة المتوسطة G ثم علمها في المعلم السابق.
3 / نختار التعديل التآلفي لسحابة النقط $(M_i(x_i ; y_i))$ المستقيم D المار من G ومعامل توجيهه يساوي 3.
أ-تحقق أن معادلة D هي : $y = 3x - 3$
ب - أرسم المستقيم D
4/ نفرض أن عدد الزبائن يتزايد وفق هذا التعديل.
أ - ماهو عدد الزبائن سنة 2007 ؟
ب-في أية سنة يتجاوز عدد الزبائن 32 مليوناً ؟

- الجزء الثاني :** بعد دراسة لاحظ صاحب شبكة توزيع الانترنت أن عدد الزبائن في الوسط الريفي (الريف) يتماشى وفق متتالية هندسية حدها الأول مرتبط بالسنة 1999 هو $u_1 = 9000$ و أساسها $r = 1.8$
(u_n ترمز إلى عدد الزبائن في السنة ذات الرتبة n)
1 / أ- تحقق أن عدد الزبائن سنة 2000 هو : $u_2 = 16200$
ب - أحسب u_3 و u_4
ج- عبر عن u_n بدلالة n
2 / في أية سنة يتجاوز عدد الزبائن 32 مليوناً ؟ نأخذ : $3478 \approx 1.8^{14}$ و $6746 \approx 1.8^{15}$
3 / باستعمال نتيجة السؤال الأول ونتيجة الجزء الثاني ، عين في أي وسط (الحضري أو الريفي) يتجاوز عدد الزبائن 32 مليوناً.

- التمرين الثاني :** البيان المقابل يمثل دالة f في معلم متعامد ومتجانس $(o ; i ; j)$.
- نفرض أن f معرفة وقابلة للاشتقاق على $]-2 ; +\infty[$ وتقبل قيمة حدية عند الفاصلة 0
- D هو المماس لمنحنى الدالة f في النقطة $(a ; -1)$ والمار بالنقطة $(e ; 3)$.
- إنطلاقا من البيان والمعطيات أعلاه :
- 1 / حدد وبدون تعليل : $f(-1) ; f(0) ; f(2) ; f(-1) ; f'(0) ; f'(-1)$.
 - 2 / أحسب نهاية الدالة f عند 2 مع تفسير النتيجة بيانيا ثم النهاية عند $+\infty$.
 - 3 / حدد إشارة $f'(x)$ و $f(x)$ على $]-2 ; +\infty[$ مع تشكيل جدول تغيرات الدالة f .
 - 4 / أكتب معادلة للمماس D .
 - 5 / نعرف على $]-2 ; +\infty[$ الدالة g كمايلي : $g(x) = [f(x)]^2$.
 - 6 / أ) أحسب $g(-1) ; g(0) ; g(2)$.



- ب) عين نهاية الدالة g عند كل من 2 و $+\infty$
- ج) أحسب $g'(x)$ ثم باستعمال جدول إشارة $f'(x)$ ، حدد إشارة $g'(x)$ ثم شكل جدول تغيراتها على $]-2 ; +\infty[$
- د) إنطلاقا من جدول تغيرات الدالة g عين عدد حلول المعادلة :
- $$\frac{3}{2}g(x) =$$

التمرين الثالث :

نعرف على المجموعة $\{R - \{-1 ; 2\}\}$ الدالة f كما يلي : $f(x) = \frac{2x^2}{x^2 - x - 2}$.

تمثيلها البياني (C_f) في معلم متعامد ومتجانس $(O ; I ; J)$.

1 / أحسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة التعريف ثم إستنتج معادلات المستقيمات المقاربة للمنحنى (C_f) .

2 / بين أن عبارة الدالة المشتقة f' هي : $f'(x) = \frac{-2x(x+4)}{(x^2 - x - 2)^2}$ ثم أدرس إشارتها.

3 / شكل جدول تغيرات الدالة f .

4 / أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1

5 / أنشيء (C_f) .

6 / k وسيط حقيقي . ناقش حسب قيم k عدد وإشارة حلول المعادلة $f(x) = k$.

إنتهى