

ІНСТРУКТИВНА КАРТА № _____

ТЕМА: ОСОБЛИВОСТІ РОЗТИНУ ТРУПІВ КОНЕЙ, ВРХ, СВИНЕЙ.

МЕТА: навчитися проводити розтин трупів.

ПРИЛАДИ І МАТЕРІАЛИ: столи для розтину трупів, ножі, скальпелі, пінцети, лігатура.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

Коня розтинають на правому боці. Відрізають передню і задню ліві кінцівки. У кобил відрізають вим'я, а у самців відпрепаровують препуцій і статевий член до його кореня. Розріз черевної стінки і огляд її органів проводять по тій же методиці, що і у худоби. Грудну порожнину розкривають і оглядають так само, як і у худоби. Витягання органів з черевної порожнини починають з сальника, селезінки, лівої нирки і кишечника. Петлю великої ободової кишки витягають у бік кінцівок, а саму ободову кишку, добре помітну по теніях і кишеньках, відкидають на спину трупа. Тонкий відділ кишечника починають видаляти з дванадцятипалої кишки, на яку в області зв'язки її з малою ободовою кишкою накладають дві лігатури, а потім перерізають. Задній відрізок дванадцятипалої, голодну і клубову кишки відокремлюють від брижі. На кінець клубової кишки накладають дві лігатури, а потім відрізають її. Тонкий відділ кишечника можна починати видаляти з клубової кишки. Після видалення кишечника оглядають брижесечні лімфатичні вузли. Малу ободову кишку виймають, заздалегідь перев'язавши двічі лігатурами передніх і задніх її кінці. Велику ободову і сліпу кишку витягають разом. В цей час оглядають інтиму черевної частини аорти і передньої брижесечної артерії. Пряму кишку видалають разом з іншими органами тазу. Шлунок витягають разом з дванадцятипалою кишкою. Органи ротової порожнини, шиї і грудної порожнини видалають як і у худоби єдиним органомкомплексом.

Голову відокремлюють від тулуба в місці з'єднання її з першим шийним хребцем (атлантом).

Перед розтином черевної і носової порожнини з черепа зрізають скроневі м'язи. Голову дрібних тварин для розтину краще укріплювати в лещата, а у коней відокремлюють нижню щелепу в області щелепного суглоба. Для розтину черевної порожнини роблять один поперечний і два бічних розпили.

У ВРХ роблять ще подовжній розпил черепа по її середній сагітальній лінії. Повністю відпиляна черепна кришка повинна бути трохи рухомою, щоб за допомогою долота і щипців – кісткотримачів можна її підняти.

Після зняття черепної кришки оглядають тверду і м'яку мозкові оболонки, а також мозок.

Носову порожнину розкривають після видалення головного мозку, поздовжнім розпиленням голови, трохи відступивши від середньої лінії, щоб уникнути пошкодження носової перегородки. Після розпилю на одній половині видно носові раковини, а на другій, носову перегородку.

У свиней з метою виключення атрофічного риніту розпил носової порожнини роблять упоперек.

ЗНАТИ:	ВМІТИ:
1. Вимоги до спецодягу для проведення патрозтину.	1. Складати протоколи і патрозтину.
2. Основні правила відбору пат матеріалу для лабораторних досліджень.	2. Основні прийоми проведення патрозтинів