

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає інформаційне повідомлення щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області станом з 24 по 30 липня 2026 року.

Кукурудза – цвітіння волоті і качана. Соя – цвітіння, утворення бобів. Соняшник – цвітіння. Картопля – в'янення бадилля. Сад – ріст та налив плодів.

Протягом звітної періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

В посівах кукурудзи злаковими блішками за середньої чисельності 7 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 10 % рослин на 77 % обстежених площ, злаковими попелицями за середньої чисельності 18 екз. на рослину в середньому пошкоджено 13 % рослин на 52 % обстежених площ, хлібними п'явицями за середньої чисельності 4 екз. на рослину в середньому пошкоджено 5 % рослин на 6 % обстежених площ, гусеницями бавовникової совки в середній чисельності 0,9 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 45 % обстежених площ, гусеницями стеблового (кукурудзяного) метелика в середній чисельності 1 екз. на заселену рослину в середньому заселено та пошкоджено 4 % рослин на 45 % обстежених площ, злаковими цикадками за середньої чисельності 3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 8 % обстежених площ. Пухирчастою сажкою в середньому уражено 0,5 % рослин (на качанах – 100 %) на 3 % обстежених площ, гелмінтоспоріозом уражено 10% рослин з розвитком хвороби 5 % на 8 % обстеженої площі (899 га).

В посівах сої на 100 п.с. в середньому уловлювалось 35 екз. люцернового клопа на 100 % обстежених площ, бульбочковими довгоносіками в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 100 % обстежених площ. Аскохитозом уражено 6 % рослин з розвитком хвороби 4 % на 100 % обстеженої площі (28 га).

В посівах соняшнику геліхризовою попелицею за середньої чисельності 9 екз. на рослину в середньому заселено та пошкоджено 6 % рослин на 54 % обстежених площ, гусеницями бавовникової совки в середній чисельності 0,4 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 19 % обстежених площ, клопами в середній чисельності 3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 4 % рослин на 11 % обстежених площ, гусеницями совки-гамма в середній чисельності 0,1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 12 % обстежених площ, гусеницями соняшникової вогнівки за середньої чисельності 1,3 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено 2 % рослин на 12 % обстежених площ. Пероноспорозом уражено 7 % рослин з розвитком хвороби 5 % на 18 % обстеженої площі, септоріозом уражено 6 % рослин з розвитком хвороби 4 % на 34 % обстеженої площі, фомозом уражено 7 % рослин з розвитком хвороби 4 % на 64 % обстеженої площі (1024 га).

Личинками колорадського жука в середній чисельності 3 екз. на кущ картоплі заселено і пошкоджено 4 % кущів. Фітофторозом уражено 10 % рослин

з розвитком хвороби 8 % (присадибні ділянки).

Фітофторозом уражено 6 % рослин томатів з розвитком хвороби 4 % (присадибні ділянки).

На присадибних ділянках у середній капусті капустяною попелицею в середній чисельності 12 екз. на заселену рослину заселено і пошкоджено 20 % рослин, гусеницями капустяної совки в середній чисельності 1,1 екз. на заселену рослину заселено і пошкоджено 5 % рослин, хрестоцвіті блішки в середній чисельності 2 екз. на заселену рослину заселено і пошкоджено 30 % рослин (присадибні ділянки).

В плодovих садах паршею уражено 6 % листків з розвитком хвороби 4 % та 2 % плодів з розвитком хвороби 1% на 40 % дерев. Плодовою гниллю в середньому уражено 8 % плодів падалиці під 50 % дерев (присадибні ділянки).