

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає оперативну інформацію щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області за період з 24 по 30 червня 2022 року.

Озимі пшениця, ячмінь – молочна-воскова стиглість. Горох – дозрівання. Кукурудза – листоутворення. Соняшник – листоутворення- початок бутонізації. Картопля – цвітіння. Сад – формування плодів.

Протягом звітної періоду за даними обстежень було обліковано наступних шкідливих організмів.

В посівах озимої пшениці хлібними клопами за середньої чисельності 0,4 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 29 % обстежених площ, середня чисельність яйцекладок шкідника 1 екз. на кв.м на 16 % обстежених площ, личинками шкідника за середньої чисельності 0,7 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 68 % обстежених площ; злаковими попелицями за середньої чисельності 5 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено 3 % рослин на 65 % обстежених площ; злаковими трипсами в середній чисельності 5 екз. на колос заселено 10 % рослин на 72 % обстежених площ; імаго хлібних жуків в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин заселено 49 % обстежених площ, імаго хлібної жужелиці в середній чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин заселено 18 % обстежених площ. Септоріозом уражено 8 % рослин з розвитком хвороби 5 % на 21 % обстежених площ (693 га).

В посівах озимого ячменю злаковими попелицями за середньої чисельності 2 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено 3 % рослин на 68 % обстежених площ, хлібними клопами за середньої чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 68 % обстежених площ (222 га).

В посівах кукурудзи злаковими попелицями в середній чисельності 9 екз. на заселену рослину заселено і пошкоджено 10 % рослин на 68 % обстежених площ, злаковими блішками в середній чисельності 5 екз. на кв.м пошкоджено 7 % рослин на 54 % обстежених площ, гусеницями озимої совки в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 13 % рослин на 16 % обстежених площ (739 га).

В посівах гороху на 100 п.с. в середньому нараховується 17 екз. горохової попелиці та 2 екз. горохового зерноїду (146 га).

В посівах соняшнику гусеницями озимої совки в середній чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин на 29 % обстежених площ, гусеницями совки-гамма в середній чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 12 % обстежених площ, гусеницями лучного метелика в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин на 15 % обстежених площ, буряковою попелицею за середньої чисельності 13 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено 7 % рослин на 14 % обстежених площ, геліхризною попелицею за середньої чисельності 10 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено 3 % рослин на 12 %

обстежених площ, ягідними клопами за середньої чисельності 3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин на 9 % обстежених площ. Септоріозом уражено 15 % рослин з розвитком хвороби 12 % на 17 % від обстежених площ, пероноспорозом уражено 3 % рослин з розвитком хвороби 2 % на 40 % обстежених площ, фомозом уражено 2 % рослин з розвитком хвороби 1 % на 30 % обстежених площ (1318 га).

Колорадським жуком в середній чисельності 1,5 екз. на кущ заселено і пошкоджено 5 % кущів картоплі, яйцекладками в середній чисельності 1 шт. на рослину в середньому заселено 9 % кущів, личинками в середній чисельності 12 шт. на кущ в середньому заселено 9 % кущів. Фітофторозом уражено 21 % рослин з розвитком хвороби 10 % (присадибні ділянки).

Фітофторозом уражено 14 % рослин томату з розвитком хвороби 5 % (присадибні ділянки).

На присадибних ділянках у ранній капусті капустяною попелицею в середній чисельності 20 екз. на заселену рослину пошкоджено 23 % рослин, білокрилкою в середній чисельності 25 екз. на заселену рослину пошкоджено 60 % рослин.

На присадибних ділянках у пізній капусті білокрилкою в середній чисельності 7 екз. на заселену рослину пошкоджено 12 % рослин.

В плодівих садах яблуневою плодожеркою гусеницями пошкоджено 5 % плодів в середньому на 40 % дерев, яблуневою попелицею в середній чисельності 7 екз. на лист пошкоджено 8 % листків в середньому на 40 % дерев. Паршею яблуні уражено 5 % листків з розвитком хвороби 3 % та 3 % плодів з розвитком хвороби 1 % на 20 % дерев на 100 % площ (4 га). Борошнистою росою уражено 10 % листків з розвитком хвороби 5 % на 50 % дерев (присадибна ділянка).