

Інфекція	Календар	Мінімальні інтервали при порушенні календаря	Назви вакцин	Примітка
Туберкульоз	більше 24 годин		БЦЖ	Жива вакцина До 2 мес. без Манту до 7 міс при відсутності підозри на контакту з туберкульозом без шкірних тестів або тесту вивільнення гамма-інтерферону
Гепатит В	Доза 1 - 2 місяці Доза 2 - 4 місяці Доза 3 - 6 місяців Доза 4 – 18 місяців	1-1 місяць (В інструкції 1-5)!	Енджерікс - В	
	Для дітей з фактором ризику Доза 1 - 0 Доза 2 - 2 місяці Доза 3 - 4 місяців Доза 4 – 6 місяців			
Коклюш, дифтерія, правець	Доза 1 - 2 місяці (АКДП) Доза 2- 4 місяці (АКДП) Доза 3- 6 місяців (АКДП) Доза 4 – 18 місяців (АКДП) Ревакцинація 1- 6 років (АДП) Ревакцинація 2 - 16 років (АДП-М) Ревакцинація 3 - 26 років (АДП-М)кожні 10 років	До 1 року: 1-1-6 старше 1 року: 1-6– за цим Календарем, якщо інтервал між першою ревакцинацією і ревакцинацією за віком становить понад 1 рік старше 7 років: 1-6 місяців-наступні кожні 10 років або за цим Календарем, але не раніше ніж 1 рік	Анатоксин коклюшно-дифтерійно-столбнячний АДС- Биолек Тетраксим Бустрикс Інфанрікс	До 6 років 11 місяців 29 днів після АДП-М Якщо дитина отримає 0 доз на першому році життя, то після року - 2+1. Якщо дитина отримає 1 дозу на першому році життя, то після року - 2+1. Якщо дитина отримає 2 дози на першому році життя, то після року - 1+1. Якщо дитина отримає 3 дози на першому році життя, то після року - +1. +1 це доза, що введена щонайменше ніж через 6 місяців
Поліомієліт	Доза 1 - 2 місяці ІПВ Доза 2 - 4 місяці ІПВ Доза 3 - 6 місяців ІПВ Доза 4 – 18 місяців ІПВ Ревакцинація 6 років ІПВ	1-1-6 місяців	Поліомієлітна вакцина. Імовакс поліо	
Гемофільна інфекція тип В	Доза 1 - 2 місяці Доза 2 - 4 місяці Доза 3 - 6 місяців Доза 4 – 18 місяців	між 1 та 2 дозами: 4 тижні, 2-а доза не вводиться, якщо 1-у дозу введено у віці від 12 місяців до 4 років 11 місяців 29 днів Між 2 та 3 дозами: 4 тижні, 3-я доза не вводиться, якщо 2-у дозу введено у віці від 12 місяців до 4 років 11 місяців 29 днів Між 3 та 4 дозами: 6 місяців, 4-а доза не вводиться,	Хіберікс	4 років 11 місяців 29 днів

		якщо 3-ю дозу введено у віці від 12 місяців до 4 років 11 місяців 29 днів		
Кір, краснуха, паратит (КПК)	Доза 1 - 1 рік Доза 2 – 4 років	1 місяць	Пріорикс Пріорикс-тетра (КПК+Вітряна віспа) М-М-Рвакспро	жива
Вірус папіломи людини	Підлітки від 9 до 14 років включно: дві дози за схемою 0, 5 – 13 місяців (друга доза вводиться в період між 5 та 13 місяцями після першої дози). Підлітки від 15 років та дорослі: три дози за схемою 0, 1, 6 місяців (друга доза вводиться в період між 1 та 2,5 місяцями після першої дози. Третя доза вводиться в період між 5 та 12 місяцями після першої дози). Підлітки віком від 9 до 13 років включно: дві дози за схемою 0 та 6 місяців (Примітка: якщо другу дозу вводять раніше, ніж через 6 місяців після першої, то слід обов'язково ввести третю дозу) АБО три дози за схемою 0, 2 та 6 місяців (другу дозу слід вводити принаймні через 1 місяць після першої, а третю – як мінімум через 3 місяці після другої дози. Всі три дози слід ввести протягом 1 року). Підлітки віком 14 років і дорослі: три дози за схемою 0, 2 та 6 місяців (другу дозу слід вводити принаймні через 1 місяць після першої, а третю – як мінімум через 3 місяці після другої дози. Всі три дози слід ввести протягом 1 року) Підлітки від 9 до 14 років включно: дві дози за схемою 0, (6 – 12 місяців) (друга доза вводиться в період між 6 та 12 місяцями після першої дози). або / та особам 15 років та старше три дози за схемою 0, 2 та 6 місяців (другу дозу слід вводити принаймні через 1 місяць після першої, а третю – як мінімум через 3 місяці після другої дози. Всі три дози слід ввести протягом 1 року)		Церварікс Гардасил Гардасил-9	Вірус папіломи людини (ВПЛ) типів 16 та 18 вірусу папіломи людини (типів 6, 11, 16, 18) квадривалентна рекомбінантна Papillomavirus (human types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)
Бустрікс –Поліо (АКДП-М + ІПВ) Інфанрікс гекса (АКДП+ІПВ+НВ+НіВ) Інфанрікс пента (АКДП+ІПВ+НВ) Гексаксім (АКДП+ІПВ+НВ+НіВ) Інфанрікс ІПВ (АКДП+ІПВ) Інфанрікс ІПВ ХІБ (АКДП+ІПВ+ХІБ) Пентаксім (АКДП+ІПВ+ХІБ) Пентабіо (АКДП+ІПВ+ ХІБ) Пента хіб (АКДП+НВ+ХІБ)				

Інфекція	Календар	Мінімальні інтервали при порушенні календаря	Назви вакцин	Примітка
Вітряна віспа	Діти починаючи з 9 місяців та дорослі 2 дози з інтервалом 6 тижнів Діти віком 9-12 місяців: 2 дози з мінімальним інтервалом 3 місяці. У дітей віком від 12 місяців до 12 років інтервал між першою і другою дозою, як мінімум 1 місяць Дорослі та діти від 13 років дві дози з інтервалом 4–8 тижнів	Не менше 4 тижнів	Варилрикс Варівакс	живий атенуйований вірус вітряної віспи
Сказ	Екстрена вакцинація Діти та дорослі (без обмежень за віком): 5 доз за схемою 0-3-7-14-28 днів. Профілактична вакцинація Діти та дорослі (без обмежень за віком): первинний курс – 3 дози за схемою 0-7-28 днів, перша ревакцинація – через 1 рік <i>(або за 6 місяців у разі зниження рівня антитіл нижче захисного порога у випадку постійного ризику інфікування)</i> , подальші ревакцинації: кожні 5 років	<i>або кожні 2 роки у разі зниження рівня антитіл нижче захисного порога у випадку частого ризику інфікування).</i>	Верораб Індіраб вакцина антирабічна очищена, інактивована	Інактивований вірус сказу
Грип	Від 6 місяців до 9 років, якщо раніше не хворіли і не вакцинувалися 2 рази з інтервалом 4 тижні. Далі щорічно.		Джисі Флю квадрівалент Ваксігрип-тетра Инфлювак	
Менінгококковая інфекція	Діти від 9 до 23 місяців: 2 дози з інтервалом не менше 3 місяців. Особи у віці від 2 до 55 років: одноразово. Діти 2-5 місяців: первинний курс з 3 доз з мінімальним інтервалом 1 місяць + бустерна доза у віці 12-15 міс (з інтервалом від 6 місяців від первинного курсу) АБО первинний курс з 2 доз з мінімальним інтервалом 2 місяці + бустерна доза у віці 12-15 міс (з інтервалом від 6 місяців від первинного курсу) <i>Примітка: після досягнення віку 24 місяці бустерна доза не вводиться.</i> Діти 6-11 місяців: первинний курс з 2 доз з мінімальним інтервалом 2 місяці + бустерна доза на другому році життя з мінімальним інтервалом 2 місяці від первинного курсу. Діти 12-23 місяців: первинний курс з 2 доз з мінімальним інтервалом 2 місяці + бустерна доза з інтервалом 12-23 місяці від первинного курсу.		Менактра Бексеро	Менінгококова інфекція (серогрупи А, С, Y, W-135) Від 9 місяців (менактра) Менінгококова інфекція (серогрупа B) Від 2 міс (бексеро)

	Діти від 2 років та дорослі (до 50 років): 2 дози з мінімальним інтервалом 1 місяць			
Пневмококковая інфекція	Немовлята віком від 6 тижнів до 6 місяців: чотири дози (інтервал між першими трьома дозами становить не менше 1 місяця; четверту дозу (ревакцинація) рекомендується вводити у віці 11-15 місяців) АБО три дози (першу дозу вводити, починаючи з 2-місячного віку, другу – через 2 місяці. Третю дозу (ревакцинація) рекомендується вводити у віці 11-15 місяців). Немовлята віком 7-11 місяців: три дози з інтервалом не менше 1 місяця (третю дозу рекомендується вводити на другому році життя). Діти віком 12-23 місяці: дві дози з інтервалом не менше 2 місяців. Немовлята віком від 6 тижнів до 6 місяців: Первинна схема 4 дози 3 дози з інтервалом не менше 1 місяця між дозами. Першу дозу у віці 6 тижнів. 4-а (бустерна) доза рекомендується не раніше ніж через 6 місяців після 3-ої дози та може застосовуватись з 9 місяців (бажано у віці між 12 та 15 місяцями) Альтернативно, у разі введення вакцини 3 дози.. 1-у дозу у віці 6 тижнів, 2-у дозу вводять через 2 місяці. Бустерна доза рекомендується не раніше ніж через 6 місяців після останньої дози з 9 місяців Немовлята віком 7 – 11 місяців: три дози (2 дози з інтервалом не менше 1 місяця між дозами; третя доза рекомендується на другому році життя з інтервалом не менше ніж 2 місяці від попередньої дози). Діти віком 12 місяців – 5 років: дві дози з інтервалом не менше 2 місяців. За інструкцією		Превенар 13 Синфлорікс Пневмосил	Пневмококова інфекція (13 штамів) Пневмококова інфекція (10 штамів + нетипована гемофільна паличка) До 5 років полісахаридна, кон'югована (10-валентна, адсорбована
Ротавірус	Двократно з 6 тижнів до 24 тижнів Діти від 6 тижнів: три дози. Першу дозу слід ввести не раніше віку 6 тижнів і не пізніше віку 12 тижнів. Інтервал між застосуванням доз – не менше 4 тижнів. Бажано, щоб курс вакцинації, який складається з трьох доз, закінчився до досягнення дитиною віку 20-22 тижні. При необхідності третю (останню) дозу можна ввести у віці до 32 тижнів.	4 тижні	Ротарикс РотаТек	Жива атенуйована, пероральна,
Жовта лихоманка	Однократно до 6 місяців заборонено. після 6 до 9 місяців за особливими показаннями		Стамарил	жива атенуйована

	після 9 місяців			
Вірус гепатиту А	1 рік- 15 років дві дози з інтервалом 6 місяців Дорослі від 16 років 1 місяць та 6 місяців (три дози) Перша доза ревакцинація через 6 місяців	1-6 міс не менше 6 місяців	Твинрикс (А +В) Хаврикс	Від 1 року
Клещевой енцефаліт	Діти від 1 до 15 років: курс первинної вакцинації з 3-х доз. Інтервал між 1-ю та 2-ю дозою – 1-3 місяці (якщо необхідно швидко набути імунітет, його можна скоротити до 2 тижнів). 3-тя доза вводиться за 5-12 місяців від 2-ї. Бустерні дози: 1-ша вводиться за 3 роки від первинного курсу. Наступні бустерні дози вводяться кожні 5 років		ФСМЕ Імун Джуніор/ Тіковак Джуніор тіковак (дорослі)	Від 1 року культуральна інактивована очищена сорбована
Черевного тифу	одноразово (0,5мл), починаючи з 2-річного віку. підшкірно або внутрішньом'язево. Ревакцинацію проводять кожні 3 роки, якщо є ризик захворювання		ТІФІМ Ві	з 2 річного віку
Коронавірусна хвороба (COVID-19)	2 дози с рекомендуемым інтервалом 21–28 дней: Доза 1: на дату начала Доза 2: через 21–28 дней после первой дозы Дві дози: 0, 14-28 днів Дві дози 0, 4-12 тижнів 0, 28 днів		Комірнаті (Pfizer/BioNTech) Коронавак (Sinovac Biotech Ltd.) Ковішелд (AstraZeneca-SKBio) Модерна (ModernaTX, Inc.)	от 16 років оптимально 28 днів оптимально 12 тижнів Інтервал до інших вакцин 14 днів