

Эндоскопическое исследование полости носа

Эндоскопическое исследование полости носа - осмотр внутренней поверхности полости носа и носоглотки при помощи 4 мм или 2 мм жесткого эндоскопа, который вводится в полость носа.

Возможные осложнения: Предстоящее эндоскопическое исследование является инвазивным инструментальным вмешательством и, несмотря на низкий уровень побочных эффектов (не более 0,1%) максимально бережное выполнение, все же несёт в себе риск возникновения следующих осложнений: 1) кровотечение; 2) затруднение дыхания; 3) местные и аллергические реакции. При возникновении вышеперечисленных осложнений может потребоваться госпитализации, неотложное интенсивное, эндоскопическое и оперативное лечение, общая анестезия.

После окончания исследования: в течение 30 минут не следует ничего есть и пить. Проинформируйте врача при появлении необычных симптомов и любых тревожащих обстоятельствах в первые часы и дни после исследования.

Альтернатива: Эндоскопическое исследование является одним из самых достоверных методов диагностики. Однако, в силу объективных причин, его выполнение в полном объеме и постановка точного диагноза возможны не во всех случаях. Возможной альтернативой эндоскопии полости носа являются лучевые методы исследования (КТ придаточных пазух носа, МРТ придаточных пазух носа).

Противопоказания: неврологические и нервно-психические заболевания, аллергические реакции на местные анестетики.

НЧУЗ санация лакун небных миндалин

НЧУЗ санация лакун небных миндалин- метод консервативного лечения хронического тонзиллита, фарингита.

Лечение осуществляется с применением аппарата ультразвукового низкочастотного оториноларингологического «Тонзиллор-ММ». Ультразвук улучшает кровообращение, лимфообращение, обладает противовоспалительным свойством. Таким образом, достигается тройное действие: освобождение глубоких отделов лакун от патологического содержимого, воздействие на патогенные бактерии глотки и гидромассаж небных миндалин. Специальной подготовки от больного не требуется. Анестезия проводится раствором 10% лидокаина (местно).

Показания:-компенсированная и субкомпенсированная формы хронического тонзиллита, катаральная и гранулезная формы хронического фарингита.

Противопоказания: неврологические и нервно-психические заболевания, фистула лабиринта, выраженная дисфункция вегетативного отдела нервной системы, туберкулез легких, злокачественные новообразования любой локализации, острые инфекционные заболевания.

Общий курс лечения 8-10 сеансов, по одному сеансу в день.