BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG
KHOA DƯỢC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2023

THÔNG TIN THUỐC

V/v: Hướng dẫn sử dụng **Methyldopa**

I. Chỉ định:

Tăng huyết áp

II. Liều dùng :

Liều bắt đầu thông thường 250 mg/lần, 2-3 lần.ngày. Tối đa 3 g/ngày.

III. Cách dùng: Uống

IV. Phụ nữ mang thai và cho con bú:

- Phụ nữ mang thai: Tương thích
- Phụ nữ cho con bú: Dữ liệu trên người hạn chế - Có thể tương thích

V. Lưu ý:

Sắt làm giảm hấp thu methyldopa, do đó không uống chung sắt và methyldopa. Uống cách nhau ít nhất 2 giờ.

VI. Tên một số sản phẩm sử dụng tại Bệnh viện Hùng Vương:

- Methyldopa 250mg
- Dopegyt 250mg
- Agidopa 250mg

Tài liệu tham khảo:

1) *Dược thư Quốc Gia Việt Nam 2022*
2) *Drugs in Pregnancy and Lactation*

Tổ TTT-Dược lâm sàng **Khoa Dược**

Ds. Nguyễn Thanh Hoài Phong **Ds. Đoàn Thị Ngọc Hân**