

Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надає інформаційне повідомлення щодо фітосанітарного стану агроценозів Кіровоградської області станом на 06 липня 2023 року.

На обстеженій площі озимої пшениці 538 га личинками клопа-черепашки заселено 85 га (16 %) в середній чисельності 0,5 екз. на кв.м. в середньому пошкоджено – 4, максимально – 5 % рослин в слабкому ступені.

В посівах озимої пшениці імаго хлібних жуків в середній чисельності – 1,1, максимально – 4 екз. на кв.м, в середньому пошкоджено 1 % рослин на 47 % обстежених площ (538 га). В посівах ячменю імаго хлібних жуків в середній чисельності 2 екз. на кв.м, в середньому пошкоджено 1 % рослин на 40 га обстежених площ.

В посівах озимої пшениці (338 га) злаковими попелицями в середній чисельності – 5, максимально – 6 екз. на колос в середньому заселено і пошкоджено – 7, максимально – 12 % рослин в слабкому ступені.

В посівах озимої пшениці імаго хлібної жужелиці в середній чисельності – 2, максимально – 3 екз. на кв.м, в середньому пошкоджено 1 % рослин на 28 % обстежених площ (538 га).

В посівах озимої пшениці гусеницями зернової совки в середній чисельності – 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин в слабкому ступені на 28 % від обстеженої площі 538 га.

В посівах кукурудзи злаковими блішками в середній чисельності – 4, максимально – 10 екз. на кв.м в середньому пошкоджено – 7, максимально – 17 % рослин в слабкому ступені на 455 га обстежених площ. В посівах кукурудзи злаковими попелицями в середній чисельності – 12, максимально – 25 екз. на заселену рослину в середньому заселено і пошкоджено – 5, максимально – 20 % рослин в слабкому ступені на 585 га від обстеженої площі 2367 га. Личинками злакових п'явиць в середній чисельності 1 екз. на заселену рослину в середньому заселено і пошкоджено 3 % рослин в слабкому ступені на 82 га від обстеженої площі 2367 га. Польовими клопами в середній чисельності 3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 2 % рослин в слабкому ступені на 82 га обстежених площ. Личинками коника зеленого в середній чисельності – 0,8, максимально – 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин кукурудзи (153 га). Гусеницями озимої совки в середній чисельності – 1, максимально – 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин кукурудзи (130 га).

В Олександрійському районі (Петрівський район) гельмінтоспоріозом уражено 2 % рослин кукурудзи з розвитком хвороби 1 % на 130 га обстежених площ, летючою сажкою уражено 1 % рослин (стебло) на 130 га кукурудзи.

Буряковою попелицею в середній чисельності – 7, максимально – 14 екз. на рослину в середньому пошкоджено – 7, максимально – 15 % рослин соняшнику (456 га). Геліхризовою попелицею в середній чисельності – 7, максимально – 25 екз. на рослину в середньому пошкоджено – 4, максимально – 6 % рослин соняшнику.

В Кропивницькому районі (Бобринецький та Кропивницький райони) гусеницями лучного метелика в середній чисельності – 0,5, максимально – 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 8 % рослин соняшнику (74 га).

В Олександрійському районі (Петрівський район) гусеницями озимої совки в середній чисельності – 1, максимально – 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено – 1, максимально – 3 % рослин соняшнику (208 га).

Гусеницями совки-гамма в середній чисельності – 0,6, максимально – 1 екз. на

кв.м в середньому пошкоджено – 2, максимально – 3 % рослин соняшнику (329 га).

В Кропивницькому районі (Бобринецький та Кропивницький райони) личинками коника зеленого в середній чисельності 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин соняшнику (124 га).

Пероноспорозом в середньому уражено – 3, максимально – 7 % рослин соняшнику з середнім розвитком хвороби – 2, максимально – 4 % на 572 га з 1792 га обстежених, фомозом в середньому уражено – 4, максимально – 7 % рослин соняшнику з середнім розвитком хвороби – 1, максимально – 2 % на 601 га з 1792 га обстежених, іржею в середньому уражено – 4, максимально – 8 % рослин соняшнику з середнім розвитком хвороби – 2, максимально – 4 % на 328 га з 1792 га обстежених, септоріозом в середньому уражено – 9, максимально – 14 % рослин соняшнику з середнім розвитком хвороби – 5, максимально – 10 % на 290 га з 1792 га обстежених.

Бульбочковими довгоносіками в середній чисельності 2 екз. на кв.м в середньому пошкоджено – 4, максимально – 6 % рослин сої (233 га).

В Кропивницькому районі (Бобринецький район) люцерновим клопом в середній чисельності – 0,5, максимально – 1 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 3 % рослин сої (93 га).

В Голованівському районі (Гайворонський район) гусеницями совки-гамма в середній чисельності 0,5 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин сої (140 га).

Аскохітозом уражено 4 % рослин сої з середнім розвитком хвороби – 1, максимально – 2 % на 180 га з 233 га обстежених.

В Кропивницькому районі (Олександрівський район) буряковою попелицею в середній чисельності 3 екз. на рослину в середньому пошкоджено 3 % рослин цукрових буряків (81 га), личинками коника зеленого в середній чисельності 0,3 екз. на кв.м в середньому пошкоджено 1 % рослин цукрових буряків (14 га).

В Кропивницькому районі (Бобринецький район) імаго колорадського жука за середньої чисельності – 2, максимально – 4 екз. на кущ в середньому заселено і пошкоджено 2 % кущів картоплі, в т.ч. в слабкому ступені – 72, середньому – 23, сильному – 5 %, яйцекладками в середній чисельності 1 шт. на рослину в середньому заселено 3 % кущів, личинками шкідника за середньої чисельності – 4, максимально – 8 екз. на кущ в середньому заселено і пошкоджено 3 % кущів картоплі (присадибні ділянки).

Фітофторозом в середньому уражено – 7, максимально – 8 % рослин картоплі (присадибні ділянки) з середнім розвитком хвороби – 4, максимально – 5 %.

В Кропивницькому районі (Бобринецький район) капустяною попелицею в середній чисельності – 10, максимально – 20 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено – 18 максимально – 20 % рослин середньої капусти в слабкому ступені, хрестоцвітими блішками в середній чисельності – 3, максимально – 5 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено – 13 максимально – 15 % рослин середньої капусти в слабкому ступені, капустяною білокрилкою в середній чисельності – 15, максимально – 25 екз. на рослину в середньому заселено і пошкоджено 50 % рослин середньої капусти в слабкому ступені (присадибні ділянки).

Спостерігається літ біланів, в середньому – 3, максимально – 5 екз. за 10 хвилин спостережень у полі зору. Спостерігається літ чортополохівки, в середньому – 1,5, максимально – 2 екз. за 10 хвилин спостережень у полі зору.

В Кропивницькому районі (Бобринецький район) в плодovих садах яблуневою попелицею в середній чисельності – 5, максимально – 10 екз. на заселений лист в середньому заселено та пошкоджено – 4, максимально – 6 % листків в середньому на 30 % дерев Гусеницями яблуневої плодожерки пошкоджено 3 % плодів на 30 % дерев (4 га).

Паршею яблуні в середньому уражено – 6, максимально – 8 % листків з середнім розвитком хвороби 4 % та в середньому уражено 3 % плодів з середнім розвитком хвороби 1 % на 30 % дерев, плодовою гниллю в середньому уражено – 2, максимально – 3 % плодів падалиці під 20 % дерев (4 га).

Плодові насадження за поширення шкідників і хвороб захищають дозволеними препаратами відповідно до розроблених рекомендацій.