

**Практический навык (манипуляция):
катетеризация мочевого пузыря пациента (мужчины) с
использованием урологического катетера Нелатона для
зabora moci na лабораторное исследование с
использованием катетера**

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 1 невыполнение – 0 частичное выполнение – 0,5
1.	<p>Вымыл руки: <i>проговорил: «Руки вымыты».</i> Подготовил необходимое оснащение на манипуляционном столике:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● масло вазелиновое стерильное; ● водный раствор хлоргексидина биглюконата 0,5 мг/мл; ● катетер урологический Нелатона; ● салфетки марлевые стерильные в индивидуальной упаковке; ● контейнер стерильный для сбора биологического материала объемом не менее 100 мл; ● лоток почкообразный; ● перчатки стерильные; ● перчатки нестерильные; ● клеенка; ● пеленка; ● судно. 	2	
2.	<p>Провёл контроль годности медицинских изделий и ЛС:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● проверил целостность упаковок медицинских изделий и стерильного перевязочного материала, их срок годности: <i>проговорил: «Целостность упаковок не нарушена, срок годности не истёк»;</i> ● проверил целостность флаконов, внешний вид ЛС, срок годности: <i>проговорил: «Целостность флаконов не нарушена, внешний вид ЛС не изменён, срок годности не истек».</i> 	2	
3.	<p>Установил контакт с пациентом:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>проговорил: «Здравствуйте. Меня зовут ... Я проведу Вам катетеризацию мочевого пузыря, Вы согласны?»;</i> 	2	

	<ul style="list-style-type: none"> ● уточнил фамилия, имя, отчество, сверил с листом назначений: <i>проговорил</i>: «<i>Назовите свою фамилию и имя</i>»; ● убедился, что пациент подмылся: <i>проговорил</i>: «<i>Вы подмылись?</i>»; ● положил на кушетку клеенку, сверху клеенки – пеленку; ● предложил занять необходимое положение: <i>проговорил</i>: «<i>Снимите нательное белье с нижней половины туловища, прилягте на спину, согните ноги в коленях и разведите бедра</i>»; ● поставил судно между ног пациента 		
4.	<p>Принял меры инфекционной безопасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● надел фартук, нарукавники; ● обработал руки: <i>проговорил</i>: «<i>Руки обработаны</i>»; ● надел перчатки нестерильные 	2	
5.	<p>Обработал наружное отверстие уретры:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● вскрыл упаковку с салфетками марлевыми; ● открыл флакон с раствором хлоргексидина биглюконата, слил в лоток 1–2 мл раствора; ● взял ведущей рукой салфетку из упаковки, смочил салфетку раствором хлоргексидина биглюконата, поливая из флакона на салфетку над лотком; ● взял половой член пациента между третьим и четвертым пальцами неведущей руки, отодвинул крайнюю плоть первым и вторым пальцами неведущей руки, обнажил головку полового члена; ● обработал салфеткой головку полового члена круговыми движениями по направлению от отверстия мочеиспускательного канала к периферии; ● снял перчатки рабочей поверхностью внутрь; ● обработал руки: <i>проговорил</i>: «<i>Руки обработаны</i>»; ● использованные МИ¹ и отходы помещал в соответствии с НПА. 	4	
6.	Подготовил необходимое оснащение:	2	

¹ МИ – медицинские изделия

	<ul style="list-style-type: none"> открыл контейнер для сбора мочи, поместил крышку наружной поверхностью на столик манипуляционный; вскрыл упаковку катетера со стороны коннектора; открыл флакон с вазелиновым маслом; вскрыл упаковку стерильных перчаток, не нарушая стерильности. 		
7.	<p>Принял меры инфекционной безопасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> обработал руки: <i>проговорил</i>: «Руки обработаны»; надел стерильные перчатки, не нарушая стерильности 	4	
8.	<p>Ввел катетер:</p> <ul style="list-style-type: none"> взял упаковку катетера неведущей рукой; захватил проксимальный конец катетера между четвертым и пятым пальцами ведущей руки. Перехватил катетер первым и вторым пальцами на расстоянии 3–4 см от дистального конца как писчее перо; облил дистальный конец катетера вазелиновым маслом, предварительно слив несколько капель в лоток; не касался катетера флаконом; приподнял половой член перпендикулярно передней брюшной стенке, удерживая его между третьим и четвертым пальцами неведущей руки. Слегка сдавил головку полового члена вблизи отверстия мочеиспускательного канала первым и вторым пальцами; ввел осторожно катетер в наружное отверстие мочеиспускательного канала и продвигал катетер по уретре, постепенно опуская половой член вниз, до появления мочи; пережал проксимальный конец катетера 	4	
9	<p>Произвел забор мочи для лабораторного исследования:</p> <ul style="list-style-type: none"> , взял контейнер для сбора мочи и направил проксимальный конец катетера в контейнер, разжал катетер и собрал мочу в контейнер; 	4	

	<ul style="list-style-type: none"> направил проксимальный конец катетера в судно; закрыл контейнер с мочой и поставил на нижнюю полку столика манипуляционного 		
10.	<p>Удалил катетер:</p> <ul style="list-style-type: none"> извлек осторожно катетер, надавливая ребром ладони другой руки над лобком пациента; поместил катетер в контейнер «Физический метод. Катетеры»; убрал судно под кушетку; спросил у пациента о ее самочувствии, попросил одеться: проговорил: «Как Вы себя чувствуете? Оденьтесь, пожалуйста» 	4	
11.	<p>Завершил манипуляцию:</p> <ul style="list-style-type: none"> убрал пеленку и kleenку с кушетки, проговорил: «Поместил пеленку и kleenку в тару для сбора белья»; снял фартук, нарукавники, печатки; обработал руки: проговорил: «Руки обработаны»; использованные МИ² и отходы помещал в соответствии с НПА; зарегистрировал выполненную манипуляцию в медицинской документации: проговорил: «Манипуляция зарегистрирована в медицинской документации» 	2	
	ВСЕГО		

² МИ – медицинские изделия