Практический навык (манипуляция):
катетеризация мочевого пузыря пациента (мужчины) с использованием урологического катетера Нелатона для забора мочи на лабораторное исследование с использованием катетера

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 1 невыполнение – 0 частичное выполнение – 0,5
1.	Вымыл руки: *проговорил: «Руки вымыты».* Подготовил необходимое оснащение на манипуляционном столике: ● масло вазелиновое стерильное; ● водный раствор хлоргексидина биглюконата 0,5 мг/мл; ● катетер урологический Нелатона; ● салфетки марлевые стерильные в индивидуальной упаковке; ● контейнер стерильный для сбора биологического материала объемом не менее 100 мл; ● лоток почкообразный; ● перчатки стерильные; ● перчатки нестерильные; ● клеенка; ● пеленка; ● судно.	2	
2.	Провёл контроль годности медицинских изделий и ЛС: ● проверил целостность упаковок медицинских изделий и стерильного перевязочного материала, их срок годности: *проговорил: «Целостность упаковок не нарушена, срок годности не истёк»;* ● проверил целостность флаконов, внешний вид ЛС, срок годности: *проговорил: «Целость флаконов не нарушена, внешний вид ЛС не изменён, срок годности не истек».*	2	
3.	Установил контакт с пациентом: ● *проговорил: «Здравствуйте. Меня зовут ... Я проведу Вам катетеризацию мочевого пузыря, Вы согласны?»;*	2	

	● уточнил фамилия, имя, отчество, сверил с листом назначений: *проговорил: «Назовите свою фамилию и имя»*; ● убедился, что пациент подмылся: *проговорил: «Вы подмылись?»;* ● положил на кушетку клеенку, сверху клеенки – пеленку; ● предложил занять необходимое положение: *проговорил: «Снимите нательное белье с нижней половины туловища, приляжте на спину, согните ноги в коленях и разведите бедра»;* ● поставил судно между ног пациента		
4.	Принял меры инфекционной безопасности: ● надел фартук, нарукавники; ● обработал руки: *проговорил: «Руки обработаны»;* ● надел перчатки нестерильные	2	
5.	Обработал наружное отверстие уретры: ● вскрыл упаковку с салфетками марлевыми; ● открыл флакон с раствором хлоргексидина биглюконата, слил в лоток 1−2 мл раствора; ● взял ведущей рукой салфетку из упаковки, смочил салфетку раствором хлоргексидина биглюконата, поливая из флакона на салфетку над лотком; ● взял половой член пациента между третьим и четвертым пальцами неведущей руки, отодвинул крайнюю плоть первым и вторым пальцами неведущей руки, обнажил головку полового члена; ● обработал салфеткой головку полового члена круговыми движениями по направлению от отверстия мочеиспускательного канала к периферии; ● снял перчатки рабочей поверхностью внутрь; ● обработал руки: *проговорил: «Руки обработаны»;* ● использованные МИ[1] и отходы помещал в соответствии с НПА.	4	
6.	Подготовил необходимое оснащение:	2	

[1] МИ – медицинские изделия

	● открыл контейнер для сбора мочи, поместил крышку наружной поверхностью на столик манипуляционный; ● вскрыл упаковку катетера со стороны коннектора; ● открыл флакон с вазелиновым маслом; ● вскрыл упаковку стерильных перчаток, не нарушая стерильности.		
7.	Принял меры инфекционной безопасности: ● обработал руки: *проговорил: «Руки обработаны»*; ● надел стерильные перчатки, не нарушая стерильности	4	
8.	Ввел катетер: ● взял упаковку катетера неведущей рукой; ● захватил проксимальный конец катетера между четвертым и пятым пальцами ведущей руки. Перехватил катетер первым и вторым пальцами на расстоянии 3−4 см от дистального конца как писчее перо; ● облил дистальный конец катетера вазелиновым маслом, предварительно слив несколько капель в лоток; ● не касался катетера флаконом; ● приподнял половой член перпендикулярно передней брюшной стенке, удерживая его между третьим и четвертым пальцами неведущей руки. Слегка сдавил головку полового члена вблизи отверстия мочеиспускательного канала первым и вторым пальцами; ● ввел осторожно катетер в наружное отверстие мочеиспускательного канала и продвигал катетер по уретре, постепенно опуская половой член вниз, до появления мочи; ● пережал проксимальный конец катетера	4	
9	Произвел забор мочи для лабораторного исследования: ● , взял контейнер для сбора мочи и направил проксимальный конец катетера в контейнер, разжал катетер и собрал мочу в контейнер;	4	

	● направил проксимальный конец катетера в судно; ● закрыл контейнер с мочой и поставил на нижнюю полку столика манипуляционного		
10.	Удалил катетер: ● извлек осторожно катетер, надавливая ребром ладони другой руки над лобком пациента; ● поместил катетер в контейнер «Физический метод. Катетеры»; ● убрал судно под кушетку; ● спросил у пациента о ее самочувствии, попросил одеться: *проговорил: «Как Вы себя чувствуете? Оденьтесь, пожалуйста»*	4	
11.	Завершил манипуляцию: ● убрал пеленку и клеенку с кушетки, *проговорил: «Поместил пеленку и клеенку в тару для сбора белья»*; ● снял фартук, нарукавники, печатки; ● обработал руки: *проговорил: «Руки обработаны»*; ● использованные МИ[2] и отходы помещал в соответствии с НПА; ● зарегистрировал выполненную манипуляцию в медицинской документации: *проговорил: «Манипуляция зарегистрирована в медицинской документации»*	2	
	ВСЕГО		

[2] МИ – медицинские изделия